

SÉRIE A, N° 3764
N° D'ORDRE : 4615

THÈSES

PRÉSENTÉES

A LA FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

POUR OBTENIR

LE GRADE DE DOCTEUR ÈS SCIENCES NATURELLES

PAR

André DESASSIS

**1^{re} THÈSE. — SUR LES MODALITÉS DE FORMATION
DES MATIÈRES GRASSES DANS LE
FRUIT D'ELAEIS GUINEENSIS Jacq.**

TABLEAUX ANNEXES

1962

PARIS
IMPRIMERIE JOUVE
15, RUE RACINE, 15

1961

SÉRIE A, N° 3764

N° D'ORDRE : 4615

THÈSES

PRÉSENTÉES

A LA FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

POUR OBTENIR

LE GRADE DE DOCTEUR ÈS SCIENCES NATURELLES

PAR

André DESASSIS

**1^{re} THÈSE. — SUR LES MODALITÉS DE FORMATION
DES MATIÈRES GRASSES DANS LE
FRUIT D'ELAEIS GUINEENSIS Jacq.**



TABLEAUX ANNEXES

PARIS

IMPRIMERIE JOUVE

15, RUE RACINE, 15

—
1961



SUR LES MODALITES DE FORMATION DES MATIERES GRASSES DANS LE
FRUIT D'ELAEIS GUINEENSIS, JACQ.

TABLEAUX ANNEXES.

Tableaux se rapportant au CHAPITRE II.

- A - Evolution de quelques caractères des fruits d'un des régimes du palmier 76-36, pendant les derniers jours de leur maturation. page 4.
- B - Evolution de quelques caractères des fruits d'un des régimes du palmier 68-36, pendant les derniers jours de leur maturation. pages 5 et 6.
- C₁ - Evolution, en poids pour un fruit, de quelques constituants des fruits de l'un des régimes de l'arbre 18-36. pages 7 et 8.
- C₂ - Evolution de quelques constituants des fruits de l'un des régimes de l'arbre 18-36, rapportés aux poids frais du fruit et de la pulpe, et à l'eau de la pulpe. pages 9 et 10.
- C₃ - Evolution de quelques constituants des fruits de l'un des régimes de l'arbre 18-36, rapportés aux poids secs de la pulpe, de la graine et de la coque et aux poids secs deshuilés de la pulpe. pages 11 et 12.
- D₁ - Evolution, en poids pour un fruit, de quelques constituants des fruits de l'un des régimes du palmier 47-36. page 13.
- D₂ - Evolution de quelques constituants des fruits de l'un des régimes de l'arbre 47-36, rapportés aux poids frais de la pulpe et à l'eau de la pulpe. page 14.
- D₃ - Evolution de quelques constituants des fruits de l'un des régimes de l'arbre 47-36, rapportés aux poids secs de la pulpe, de la graine et de la coque et aux poids secs deshuilés de la pulpe. pages 15 et 16.
- E₁ - Evolution, en poids pour un fruit, de quelques constituants des fruits de l'un des régimes du palmier 101-36. pages 17 et 18.
- E₂ - Evolution de quelques constituants des fruits de l'un des régimes de l'arbre 101-36 rapportés aux poids frais et aux poids secs, de chacun des composants du fruit. pages 19 et 20.
- E₃ - Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 101-36, en poids pour chacun des composants du fruit. pages 21-22 et 23

- E₄ - Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 101-36, rapportés aux poids frais de chacun des constituants du fruit.
pages 24-25 et 26.
- E₅ - Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 101-36 rapportés aux poids secs de chacun des composants du fruit.
pages 27-28 et 29.
- E₆ - Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 101-36, rapportés aux poids secs deshuilés de la pulpe et de la graine.
pages 30 et 31.
- E₇ - Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 101-36, rapportés à l'eau de chacun des composants du fruit.
pages 32-33 et 34.
- F₁ - Evolution, en poids pour un fruit, de quelques constituants des fruits de l'un des régimes du palmier 17-37 436.
pages 35 et 36.
- F₂ - Evolution de quelques constituants des fruits d'un des régime de l'arbre 17-37 436, rapportés aux poids frais et aux poids secs de chacun des composants du fruit.
pages 37 et 38.
- F₃ - Evolution de quelques constituants minéraux des fruits de l'un des régimes de l'arbre 17-37 436, en poids pour chacun des composants du fruit
pages 39-40 et 41.
- F₄ - Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 17-37 436, rapportés aux poids frais de chacun des composants du fruit.
pages 42-43 et 44.
- F₅ - Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 17-37 436 rapportés aux poids secs de chacun des composants du fruit.
pages 45-46 et 47.
- F₆ - Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 17-37 436 rapportés aux poids secs deshuilés de la pulpe et de la graine
pages 48 et 49.
- F₇ - Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 17-37 436, rapportés à l'eau de chacun des composants du fruit.
pages 50-51 et 52.

Pour les tableaux du chapitre III voir page 53.

Tableau A

Evolution de quelques caractères des fruits d'un des régimes du palmier 76,36,
pendant les derniers jours de leur maturation.

Date du prélèvement	Temps en jours avant ou après maturité	Poids pour un fruit en grammes (*)					Pourcentages.			
		Fruit entier	Pulpe fraîche	Pulpe sèche	Eau de la pulpe.	Matières grasses de la pulpe	$\frac{\text{Pulpe}}{\text{fruit}}$	$\frac{\text{Eau}}{\text{pulpe}} \frac{\text{fraîche}}$	$\frac{\text{M. G.}}{\text{pulpe}} \frac{\text{fraîche}}$	$\frac{\text{M. G.}}{\text{pulpe}} \frac{\text{sèche}}$
7.9.54	-21	14,6	10,3	2,65	7,67	1,11	70,8	74,3	10,7	41,9
14.9.54	-14	15,7	10,5	4,07	6,47	2,34	67,2	61,5	22,2	57,5
20.9.54	-8	15,7	10,4	5,27	5,15	3,57	66,2	49,4	34,3	67,8
24.9.54	-4	16,0	10,4	5,42	4,95	3,67	65,2	48,0	35,3	67,7
28.9.54	0	15,8	11,2	6,29	4,90	4,36	71,3	43,8	39,0	69,3
30.9.54	+2	17,5	12,1	6,98	5,10	4,90	69,2	42,2	40,5	70,0
4.10.54	+6	16,6	11,2	6,28	4,87	4,42	67,1	43,6	39,6	70,3

(*) - Moyenne de 10 fruits pour chaque prélèvement.

100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

Tableau B
Evolution de quelques caractères des fruits d'un des régimes du palmier 68.36,
pendant les derniers jours de leur maturation.

Date du prélèvement	Temps en jours avant ou après maturité	Poids en grammes pour un fruit (*)					
		Fruit entier	Pulpe fraîche	Pulpe sèche	Eau de la pulpe	Matières grasses de la pulpe	Pulpe sèche deshuillée
16.12.54	- 30	18,9	11,30	2,45	8,55	0,58	1,85
22.12.54	- 24	18,7	11,50	2,90	8,60	0,99	1,91
27.12.54	- 19	16,5	10,05	3,15	6,90	1,40	1,75
30.12.55	- 16	20,5	12,95	4,35	8,60	2,17	2,16
3. 1.55	- 12	20,2	12,40	4,85	7,55	2,85	2,05
17. 1.55	- 8	19,4	11,95	5,20	6,75	3,05	2,10
12. 1.55	- 3	21,0	13,70	6,45	7,25	3,11	2,32
14. 1.55	- 1	20,7	13,05	6,75	6,30	4,50	2,25
17. 1.55	+ 2	21,0	13,75	7,30	6,45	4,90	2,45

(*) - Moyenne de 10 fruits pour les prélèvements - 24 et - 19, de 8 fruits pour tous les autres.

Tableau B (suite et fin)

Temps en jours avant ou après maturité	Pulpe fruit	Pourcentages		P.s.d.	M.G.
		Eau	M.G.		
		Pulpe fraîche	Pulpe fraîche	Pulpe fraîche	Pulpe sèche
- 30	59,9	78,3	5,1	16,4	23,3
- 24	61,5	74,8	8,6	16,4	34,2
- 19	61,5	68,7	13,8	17,4	43,5
- 16	64,0	66,6	16,7	15,85	50,1
- 12	61,2	60,7	22,7	16,15	57,9
- 8	61,6	56,0	26,6	17,10	60,3
- 3	65,3	52,9	30,0	16,85	63,7
- 1	63,0	48,2	34,5	16,70	66,6
+ 2	44,5	47,0	35,7	16,90	67,6

Tableau C₁

Evolution, en poids pour un fruit, de quelques constituants des fruits de l'un des régimes de l'arbre 18.36

Date des prélèvements	Temps en jours avant ou après maturité	Fruit entier	Poids pour un fruit en grammes (*)	Pulpe fraîche	Pulpe sèche	eau de la pulpe	Matières grasses de la pulpe	Pulpe sèche deshuillée
9.2.55	-30	13,2 13,0	9,32 9,54	1,27 1,26	8,05 7,68	0,022 0,018	1,24 1,24	
14.2.55	-25	14,4 14,0	9,18 9,40	1,33 1,41	7,84 7,98	0,016 0,021	1,34 1,36	
21.2.55	-18	14,0 14,7	9,36 9,52	1,43 1,48	7,93 8,05	0,123 0,136	1,28 1,30	
24.2.55	-15	13,2 13,5	8,86 9,06	1,55 1,61	7,30 7,46	0,307 0,316	1,33 1,24	
28.2.55	-11	15,6 15,4	10,06 8,92	2,24 2,19	7,82 6,72	0,710 0,816	1,47 1,36	
3.3.55	-8	14,7 15,5	9,78 9,72	2,04 2,15	7,36 7,56	0,661 0,726	1,32 1,39	
7.3.55	-4	16,3 16,4	10,60 10,50	2,77 3,06	7,82 7,44	1,135 1,422	1,50 1,60	
11.3.55	0	19,7 18,1	12,50 11,70	3,70 3,52	8,80 8,15	1,802 1,640	1,87 1,77	
14.3.55	+3	20,2 20,9	11,85 13,15	4,35 5,18	7,49 7,07	2,250 2,070	1,81 2,00	

Tableau C₁ (suite et fin)

Temps en jours avant ou après maturité.	Eléments minéraux de la pulpe d'un fruit en milligrammes (*)				
	Azote	Phosphore	Potassium	Calcium	Magnésium
-30	14,0	1,46	30,0	10,85	8,50
	14,6	1,41	29,9	10,95	8,40
-25	15,9	1,80	34,7	11,55	9,25
	16,3	1,84	36,4	12,70	9,50
-18	15,4	1,66	36,5	11,30	9,20
	16,0	1,72	37,7	11,30	9,35
-15	15,0	1,70	35,8	11,40	9,30
	15,2	1,56	32,9	11,60	9,35
-11	18,8	1,88	38,4	11,20	9,80
	17,5	1,65	35,2	11,20	8,90
-8	16,9	1,62	35,1	10,70	8,80
	17,6	1,82	38,2	10,80	1,00
-4	18,2	1,83	37,5	10,15	9,45
	20,8	1,97	38,9	10,60	1,00
0	23,4	2,42	42,2	10,70	9,40
	22,6	2,25	39,7	9,90	8,25
+3	23,5	2,21	37,6	10,80	9,55
	27,4	2,44	39,8	11,20	10,20

(*) Moyenne de 5 fruits pour chaque échantillon.

Evolution de quelques constituants des fruits de l'un des régimes de l'arbre 16.36, rapportés aux poids frais du fruit et de la pulpe et à l'eau de la pulpe.

Tableau C₂

Temps en jours avant ou après maturité	%	En grammes		Pulpe sèche deshuilée	En grammes		
		Pour cent grammes de pulpe fraîche	Pour cent grammes de pulpe fraîche		Pour mille grammes de pulpe	Calcium	Magnésium
-30	70,8	86,4	0,23	13,3	3,70	1,35	1,05
	68,6	86,0	0,20	13,0	3,90	1,45	1,10
-25	63,8	85,5	0,75	14,6	4,45	1,45	1,20
	67,5	85,0	0,22	14,5	4,55	1,60	1,20
-18	66,9	84,6	1,30	13,7	4,60	1,45	1,15
	64,7	84,5	2,50	13,6	4,70	1,40	1,15
-15	66,9	82,4	3,60	15,0	4,90	1,55	1,25
	67,2	82,4	3,50	13,8	4,40	1,55	1,25
-11	64,6	77,6	7,05	14,6	4,90	1,45	1,25
	58,0	75,5	9,15	15,2	5,25	1,65	1,30
-8	63,0	78,2	7,10	14,2	4,30	1,45	1,20
	62,6	77,8	7,30	14,3	5,05	1,45	1,35
-4	61,3	73,8	10,70	14,1	4,80	1,30	1,20
	60,4	71,0	13,55	15,2	5,25	1,45	1,35
0	63,5	70,3	14,40	14,9	4,80	1,20	1,05
	64,5	69,9	14,90	15,2	4,85	1,20	1,05
+ 3	58,3	63,4	20,80	15,2	5,05	1,45	1,25
	62,9	60,5	23,40	15,2	5,00	1,40	1,30

20

21

22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101

102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Tableau C₂ (suite)

Temps en jours avant ou après maturité.	En grammes				
	Pour mille grammes de pulpe fraîche.				
	Azote	Phosphore	Potassium	Calcium	Magnésium
- 30	1,50	0,160	3,20	1,15	0,90
	1,53	0,150	3,15	1,15	0,90
- 25	1,73	0,190	3,80	1,25	1,00
	1,74	0,195	3,90	1,35	1,00
- 18	1,64	0,180	3,90	1,20	1,00
	1,68	0,180	3,95	1,20	1,05
- 15	1,70	0,190	4,05	1,30	1,05
	1,58	0,175	3,55	1,30	1,05
- 11	1,87	0,185	3,85	1,10	0,95
	1,96	0,185	4,00	1,25	1,00
- 8	1,82	0,175	3,80	1,15	0,95
	1,81	0,185	3,95	1,10	1,05
- 4	1,72	0,175	3,55	0,95	0,90
	1,98	0,190	3,70	1,00	0,95
0	1,87	0,195	3,35	0,85	0,75
	2,02	0,195	3,40	0,85	0,70
+ 3	1,98	0,185	3,15	0,90	0,80
	2,08	0,185	3,05	0,85	0,75

Tableau C₃

Evolution de quelques constituants des fruits de l'un des régimes de l'arbre 18.36.
rapportés aux poids secs de la pulpe, et au poids sec deshuilé de la pulpe.

Temps en jours avant ou après maturité.	Matières minérales de la pulpe en grammes pour cent grammes de pulpe sèche desuillée.					
	$\frac{\%}{\text{M.G.}}$ Pulpe sèche	Azote	Phosphore	Potassium	Calcium	Magnésium
- 30	1,75 1,45	1,13 1,18	0,118 0,114	2,42 2,41	0,875 0,885	0,690 0,680
- 25	1,20 1,50	1,19 1,20	0,134 0,135	2,59 2,68	0,860 0,935	0,690 0,700
- 18	8,60 12,30	1,20 1,23	0,130 0,132	2,85 2,90	0,685 0,670	0,720 0,720
- 15	20,40 19,70	1,13 1,23	0,128 0,126	2,69 2,65	0,260 0,940	0,700 0,750
- 11	31,70 38,40	1,28 1,29	0,129 0,121	2,62 2,60	0,760 0,820	0,670 0,655
- 8	32,40 33,80	1,28 1,27	0,123 0,131	2,66 2,75	0,810 0,780	0,665 0,725
- 4	41,00 46,50	1,21 1,30	0,122 0,123	2,50 2,43	0,675 0,665	0,630 0,630
0	48,70 49,30	1,25 1,29	0,129 0,127	2,25 2,24	0,570 0,560	0,500 0,465
+ 3	56,60 59,30	1,30 1,37	0,122 0,122	2,08 1,99	0,595 0,560	0,525 0,510

82

83

84

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101

102

103

104

105

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121

Tableau C₃ (suite et fin)

Evolution de quelques constituants des fruits de l'un des régimes de l'arbre 13.36.
rapportés aux poids secs de la graine et de la coque.

Temps en jours avant ou après maturité	Matières minérales de la graine en grammes pour cent grammes de graine sèche.					En grammes pour cent grammes de coques sèches.	
	Azote	Phosphore	Potassium	Calcium	Magnésium	Azote	Phosphore
- 30	1,24	0,116	0,215	0,116	0,175	0,365	0,0275
	1,21	0,118	0,175	0,126	0,170	0,370	0,0280
- 25	1,07	0,107	0,225	0,102	0,155	0,350	0,0245
	1,10	0,101	0,195	0,103	0,165	0,345	0,0220
- 18	1,06	0,094	0,275	0,096	0,150	0,325	0,0190
	1,02	0,088	0,275	0,086	0,150	0,320	0,0180
	1,13	0,118	0,270	0,100	0,165	0,335	0,0140
- 15	1,111	0,132	0,275	0,099	0,165	0,330	0,0140
	1,03	0,111	0,285	0,091	0,136	0,310	0,0130
- 11	0,98	0,084	0,355	0,076	0,137	0,315	0,0125
	1,01	0,071	0,310	0,082	0,141	0,320	0,0130
- 8	1,06	0,090	0,360	0,087	0,145	0,295	0,0120
	1,00	0,096	0,370	0,080	0,136	0,300	0,0100
- 4	0,95	0,085	0,380	0,071	0,137	0,300	0,0110
	0,99	0,089	0,385	0,080	0,137	0,290	0,0090
0	0,98	0,094	0,390	0,082	0,143	0,295	0,0095
	0,92	0,085	0,405	0,073	0,138	0,285	0,0100
+ 3	0,98	0,082	0,385	0,069	0,140	0,295	0,0090

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

101
102

103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.

201

202

203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300.

301

302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400.

401

402

403

404

405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500.

501

502

503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600.

601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700.

701

Tableau D₁

Evolution en poids pour un fruit de quelques constituants des fruits de l'un des régimes
du palmier 47.36.

| Date
des
prélève-
ments. | Temps
en
jours
avant
ou après
maturité | Poids pour un fruit en grammes (*) | | | | | Eléments minéraux de la pulpe
d'un fruit en milligrammes (*) | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | Fruit
entier | Pulpe
fraîche | Pulpe
sèche | Eau
de la
pulpe | Matières
grasses
de la
pulpe | Pulpe
sèche
deshuillée | Azote | Phosphore | Potassium | Calcium | Magnésium |
| 4.2.55 | -40 | 16,7
16,3 | 10,3
10,3 | 1,68
1,67 | 8,66
8,64 | 0,15
0,13 | 1,56
1,54 | 19,2
19,4 | 2,21
1,90 | 35,8
33,3 | 13,80
14,20 | 14,80
16,50 |
| 8.2.55 | -36 | 16,7
17,2 | 10,7
10,2 | 1,84
1,83 | 8,86
8,30 | 0,37
0,40 | 1,61
1,49 | 19,8
18,0 | 1,83
1,75 | 36,0
35,2 | 13,00
12,90 | 14,25
14,40 |
| 11.2.55 | -33 | 19,0
16,7 | 10,7
10,6 | 2,08
2,29 | 8,58
8,20 | 0,46
0,82 | 1,60
1,56 | 22,6
21,2 | 1,89
2,00 | 37,7
35,4 | 13,50
11,50 | 16,35
13,80 |
| 14.2.55 | -30 | 19,1
18,8 | 11,4
10,9 | 2,81
2,47 | 8,63
8,40 | 0,98
0,84 | 1,82
1,71 | 21,4
21,5 | 2,24
2,17 | 38,4
37,6 | 13,60
11,40 | 17,20
14,30 |
| 17.2.55 | -27 | 18,5
16,1 | 11,1
12,0 | 3,47
3,01 | 7,66
8,08 | 1,71
1,43 | 1,67
1,65 | 21,7
21,7 | 2,08
2,32 | 34,8
36,1 | 9,10
7,10 | 12,35
13,00 |
| 21.2.55 | -23 | 19,5
19,2 | 12,0
12,0 | 4,01
4,18 | 7,17
7,04 | 2,22
2,37 | 1,79
1,74 | 24,9
24,5 | 2,50
2,45 | 35,6
34,8 | 8,70
8,80 | 12,60
12,20 |
| 24.2.55 | -20 | 15,5
18,0 | 9,7
11,7 | 3,82
4,51 | 5,90
7,22 | 2,20
2,77 | 1,49
1,63 | 22,2
23,3 | 2,23
2,10 | 30,0
29,0 | 8,35
7,90 | 11,20
11,70 |
| 28.2.55 | -16 | 18,0
19,3 | 10,5
11,6 | 4,67
4,90 | 5,86
6,74 | 2,84
2,90 | 1,74
1,97 | 22,6
29,0 | 2,14
2,44 | 28,0
34,1 | 6,30
9,75 | 11,80
13,10 |
| 3.3.55 | -13 | 17,7
17,6 | 11,2
10,9 | 5,22
5,50 | 6,04
5,46 | 3,42
3,77 | 1,75
1,67 | 24,9
24,2 | 2,30
2,14 | 29,2
24,9 | 6,70
7,35 | 9,10
9,30 |
| 7.3.55 | -9 | 16,9
18,1 | 10,9
11,7 | 5,53
5,82 | 5,38
5,47 | 3,67
3,74 | 1,75
2,01 | 25,0
28,5 | 2,15
2,49 | 26,2
27,1 | 7,65
8,25 | 9,75
10,40 |
| 11.3.55 | -5 | 18,9
18,6 | 12,7
12,5 | 7,18
6,99 | 5,48
5,49 | 5,14
4,98 | 1,91
1,94 | 29,8
28,9 | 2,50
2,39 | 24,1
23,3 | 6,50
5,80 | 7,70
7,45 |
| 16.3.55 | 0 | 20,4
18,2 | 13,1
11,9 | 7,90
7,34 | 5,24
4,60 | 5,61
5,28 | 2,27
2,14 | 31,6
33,2 | 2,70
2,56 | 22,3
21,6 | 5,35
5,50 | 6,60
6,15 |
| 21.3.55 | +5 | 18,1
20,1 | 12,0
13,4 | 7,39
8,36 | 4,61
5,08 | 5,80
5,98 | 2,01
2,32 | 31,4
39,2 | 2,56
3,13 | 20,3
24,9 | 6,20
5,90 | 5,65
5,45 |

Tableau D₂

Evolution de quelques constituants des fruits de l'un des régimes de l'arbre 47.36 rapportés aux poids frais de la pulpe et à l'eau de la pulpe.

| Temps en jours avant ou après maturité. | En grammes pour 100 grammes de pulpe fraîche. | | | | En grammes pour 1.000 grammes de pulpe fraîche | | | | En grammes pour 1.000 grammes d'eau de la pulpe | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | % Pulpe fruit | Eau | Matières grasses | Pulpe sèche déshuillée | Azote | Phosphore | Potassium | Calcium | Magnésium | Potassium | Calcium | Magnésium |
| -40 | 61,6
63,4
64,2 | 83,7
83,8
83,0 | 1,45
1,25
3,40 | 14,80
14,90
13,75 | 1,95
1,90
1,85 | 0,200
0,185
0,170 | 3,50
3,25
3,35 | 1,35
1,40
1,20 | 1,45
1,60
1,35 | 4,15
3,35
4,05 | 1,60
1,65
1,45 | 1,70
1,90
1,60 |
| -36 | 59,8
59,4
63,5 | 81,2
80,5
77,4 | 3,95
4,35
7,70 | 14,90
15,10
14,85 | 1,80
2,10
2,00 | 0,170
0,175
0,190 | 3,45
3,55
3,35 | 1,25
1,25
1,10 | 1,35
1,55
1,30 | 4,25
4,40
4,35 | 1,55
1,60
1,40 | 1,75
1,90
1,70 |
| -30 | 60,0
58,0 | 75,4
77,2 | 8,60
7,70 | 16,00
15,10 | 1,95
2,00 | 0,195
0,200 | 3,35
3,45 | 1,20
1,05 | 1,50
1,30 | 4,45
4,50 | 1,60
1,35 | 2,00
1,70 |
| -27 | 60,0
62,0 | 68,8
72,0 | 15,40
12,70 | 15,75
15,20 | 1,95
1,80 | 0,185
0,195 | 3,15
3,00 | 0,80
0,60 | 1,10
1,20 | 4,55
4,45 | 1,20
0,90 | 1,60
1,60 |
| -23 | 57,4
59,4 | 64,0
62,7 | 19,80
21,15 | 10,05
16,10 | 2,05
2,05 | 0,210
0,205 | 2,95
3,00 | 0,60
0,75 | 1,05
1,00 | 4,95
4,95 | 1,20
1,05 | 1,75
1,75 |
| -20 | 62,5
65,1 | 60,8
61,6 | 22,70
23,60 | 16,60
14,85 | 2,30
2,00 | 0,230
0,180 | 3,10
2,45 | 0,85
0,65 | 1,15
1,00 | 5,10
4,65 | 1,40
1,10 | 1,90
1,60 |
| -16 | 58,7
60,3 | 55,7
57,8 | 26,90
25,00 | 17,45
17,15 | 2,15
2,50 | 0,205
0,210 | 2,65
2,95 | 0,80
0,85 | 1,10
1,15 | 4,80
5,05 | 1,40
1,45 | 2,00
1,95 |
| -13 | 63,4
61,8 | 53,6
49,9 | 30,30
34,40 | 16,05
15,75 | 2,20
2,20 | 0,205
0,195 | 2,65
2,30 | 0,60
0,65 | 0,80
0,35 | 4,85
4,55 | 1,10
1,35 | 1,50
1,70 |
| -9 | 64,6
64,7 | 49,3
50,7 | 33,70
32,80 | 17,10
17,80 | 2,30
2,45 | 0,195
0,205 | 2,40
2,30 | 0,70
0,70 | 0,90
0,90 | 4,90
4,95 | 1,40
1,50 | 1,80
1,90 |
| -5 | 67,0
67,0 | 43,2
44,0 | 40,60
39,90 | 16,10
16,20 | 2,35
2,30 | 0,195
0,190 | 1,90
1,85 | 0,50
0,45 | 0,60
0,60 | 4,40
4,70 | 1,20
1,05 | 1,40
1,35 |
| 0 | 64,5
65,6 | 39,9
38,5 | 42,70
43,50 | 17,40
18,00 | 2,40
2,80 | 0,205
0,215 | 1,70
1,80 | 0,40
0,45 | 0,50
0,50 | 4,25
4,70 | 1,00
1,00 | 1,25
1,35 |
| + 5 | 66,0
66,7 | 38,2
37,9 | 44,20
44,50 | 17,50
17,70 | 2,60
2,90 | 0,210
0,235 | 1,70
1,85 | 0,45
0,50 | 0,45
0,40 | 4,40
4,90 | 1,20
1,30 | 1,25
1,10 |

(*) (se rapporte au tableau D₁) Moyenne de 5 fruits pour chaque prélèvement.

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Tableau D₃

Evolution de quelques constituants des fruits de l'un des régimes de l'arbre 47.36, rapportés aux poids secs de la pulpe et au poids sec déshuilé de la pulpe.

| Temps en jours avant ou après maturité | % M.G.
Pulpe sèche | Matériau minéral pour 100 grammes de pulpe sèche déshuilée | | | | |
|--|-----------------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | Azote | Phosphore | Potassium | Calcium | Magnésium |
| - 40 | 9,0
7,8 | 1,23
1,26 | 0,130
0,123 | 2,30
2,16 | 0,885
0,925 | 0,950
1,070 |
| - 36 | 20,0
21,0 | 1,21
1,23 | 0,114
0,117 | 2,24
2,36 | 0,810
0,870 | 0,885
0,965 |
| - 33 | 22,4
33,2 | 1,41
1,36 | 0,118
0,128 | 2,36
2,29 | 0,850
0,735 | 1,020
0,835 |
| - 30 | 35,0
34,0 | 1,23
1,26 | 0,123
0,127 | 2,11
2,20 | 0,750
0,655 | 0,945
0,835 |
| - 27 | 49,6
45,5 | 1,30
1,32 | 0,125
0,141 | 2,08
2,19 | 0,545
0,430 | 0,740
0,790 |
| - 23 | 55,2
56,7 | 1,39
1,41 | 0,140
0,141 | 1,99
2,00 | 0,485
0,505 | 0,705
0,700 |
| - 20 | 57,8
61,5 | 1,43
1,49 | 0,150
0,130 | 2,01
1,77 | 0,560
0,480 | 0,750
0,720 |
| - 16 | 60,5
59,4 | 1,30
1,47 | 0,123
0,124 | 1,61
1,73 | 0,480
0,495 | 0,680
0,665 |
| - 13 | 65,4
68,6 | 1,42
1,45 | 0,131
0,128 | 1,67
1,49 | 0,380
0,440 | 0,560
0,520 |
| - 9 | 66,4
65,2 | 1,43
1,42 | 0,123
0,119 | 1,50
1,35 | 0,440
0,410 | 0,560
0,515 |
| - 5 | 71,5
71,5 | 1,56
1,49 | 0,131
0,123 | 1,26
1,20 | 0,340
0,300 | 0,405
0,385 |
| 0 | 71,2
70,6 | 1,39
1,55 | 0,119
0,120 | 0,98
1,01 | 0,280
0,285 | 0,290
0,285 |
| + 5 | 71,6
71,6 | 1,56
1,79 | 0,127
0,135 | 1,01
1,07 | 0,270
0,275 | 0,245
0,235 |




Tableau D₃ (suite et fin)

Evolution de quelques constituants des fruits de l'un des régimes de l'arbre 47.36, rapportés aux poids secs de la graine et de la coque.

| Temps en jours avant ou après maturité | Matières minérales de la graine en grammes pour 100 grammes de la graine sèche. | | | | | en grammes pour 100 grammes de coques séchées. | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|
| | Azote | Phosphore | Potassium | Calcium | magnésium | Azote | Phosphore |
| - 40 | 0,945
0,935 | 0,109
0,119 | 0,305
0,270 | 0,075
0,079 | 0,170
0,165 | 0,335
0,375 | 0,013
0,013 |
| - 36 | 0,995
0,985 | 0,069
0,084 | 0,305
0,280 | 0,081
0,076 | 0,155
0,165 | 0,375
0,360 | 0,011
0,011 |
| - 33 | 0,930
0,860 | 0,111
0,125 | 0,290
0,285 | 0,062
0,082 | 0,160
0,160 | 0,345
0,340 | 0,011
0,012 |
| - 30 | 0,925
0,855 | 0,111
0,101 | 0,320
0,320 | 0,080
0,077 | 0,155
0,210 | 0,335
0,365 | 0,011
0,011 |
| - 27 | 0,955
0,940 | 0,081
0,086 | 0,345
0,340 | 0,074
0,072 | 0,160
0,160 | 0,335
0,350 | 0,013
0,011 |
| - 23 | 0,990
0,940 | 0,110
0,097 | 0,380
0,350 | 0,101
0,085 | 0,175
0,160 | 0,350
0,355 | 0,010
0,006 |
| - 20 | 0,950
0,950 | 0,101
0,091 | 0,320
0,360 | 0,078
0,082 | 0,155
0,165 | 0,330
0,340 | 0,008
0,010 |
| - 16 | 1,040
0,920 | 0,079
0,089 | 0,360
0,365 | 0,082
0,070 | 0,165
0,150 | 0,345
0,355 | 0,010
0,010 |
| - 13 | 0,950
0,950 | 0,089
0,082 | 0,415
0,345 | 0,072
0,063 | 0,150
0,145 | 0,345
0,340 | 0,007
0,006 |
| - 9 | 0,910
0,955 | 0,103
0,075 | 0,375
0,370 | 0,081
0,072 | 0,150
0,155 | 0,330
0,355 | 0,008
0,008 |
| - 5 | 0,910
0,865 | 0,075
0,085 | 0,395
0,370 | 0,070
0,073 | 0,155
0,155 | 0,330
0,330 | 0,007
0,006 |
| 0 | 0,940
0,900 | 0,077
0,083 | 0,385
0,360 | 0,084
0,074 | 0,155
0,160 | 0,325
0,330 | 0,006
0,007 |
| + | 0,945
0,985 | 0,106
0,092 | 0,365
0,375 | 0,079
0,080 | 0,160
0,160 | 0,330
0,330 | 0,008
0,006 |

20

21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

24

25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Tableau F₁

Evolution en poids pour un fruit de quelques constituants des fruits de l'un des régimes du palmier ioi.36 (*)

| Date des prélèvements. | Temps en jours avant ou après maturité | Poids d'un fruit entier frais en grammes | En grammes pour la pulpe d'un fruit. | | | | |
|------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Poids frais | Poids sec | Eau | Matières grasses | Poids sec déshuilé |
| 19.4.56 | - 131 | 4,35
4,25 | 3,25
3,10 | 0,65
0,54 | 2,60
2,85 | - | - |
| 9.5.56 | - 111 | 9,40
10,40 | 6,30
7,35 | 0,96
1,03 | 5,85
6,00 | - | - |
| 28.5.56 | - 92 | 13,90
14,05 | 9,35
8,70 | 1,45
1,58 | 7,90
7,10 | - | - |
| 12.6.56 | - 77 | 14,85
15,50 | 9,05
9,55 | 1,56
1,62 | 7,50
7,96 | - | - |
| 20.6.56 | - 69 | 14,70
16,65 | 9,15
9,65 | 1,50
1,66 | 7,85
8,00 | - | - |
| 28.6.56 | - 61 | 15,50
15,75 | 9,40
9,25 | 1,59
1,68 | 7,85
7,55 | 0,02
0,02 | 1,57
1,56 |
| 6.7.56 | - 53 | 14,55
14,75 | 9,55
9,10 | 1,53
1,57 | 8,00
7,55 | 0,02
0,02 | 1,44
1,50 |
| 28.8.56 | 0 | 13,50
14,35
14,60
15,10 | 8,20
8,50
8,65
9,25 | 5,62
5,85
6,00
6,40 | 2,60
2,65
2,65
2,85 | 4,14
4,27
4,39
4,72 | 1,44
1,56
1,60
1,67 |

(*) - Moyenne de 10 fruits pour chaque échantillon des prélèvements -131 et -111, de 5 fruits pour tous les autres échantillons.

Tableau E₁ (suite, et fin)

Evolution en poids pour un fruit de quelques constituants des fruits de l'un
des régimes du palmier 101.36

| Temps en
jours avant
ou après
maturité. | En grammes pour la graine d'un fruit | | | | | En grammes pour la coque
d'un fruit. | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | Poids
secs
fruits | Poids
sec | Eau | Matières
grasses | Poids
sec
deshuilé | Poids
frais | Poids
sec | Eau |
| -131 | (0,40)
(0,10) | - | - | - | - | 0,70
0,75 | 0,070
0,125 | 0,630
0,625 |
| -111 | (0,20)
(0,45) | 0,0035
0,008 | (0,1965)
(0,440) | - | - | 2,40
2,90 | 0,465
0,525 | 1,96
2,40 |
| -92 | 0,55
0,85 | 0,036
0,077 | 0,515
0,775 | 0,003
0,016 | 0,0325
0,059 | 4,00
4,50 | 1,73
2,13 | 2,27
2,39 |
| -77 | 1,05
1,08 | 0,222
0,234 | 0,830
0,850 | 0,070
0,083 | 0,150
0,150 | 4,75
4,90 | 3,06
3,17 | 1,71
1,72 |
| -69 | 1,02
1,19 | 0,343
0,406 | 0,680
0,780 | 0,138
0,167 | 0,205
0,235 | 4,55
5,15 | 3,15
3,52 | 1,42
1,62 |
| -61 | 1,20
1,27 | 0,498
0,620 | 0,700
0,650 | 0,223
0,280 | 0,252
0,338 | 4,90
5,20 | 3,63
3,83 | 1,27
1,38 |
| -53 | - | - | - | - | - | 4,30
4,60 | 3,54
3,61 | 0,78
1,01 |
| 0 | 1,30
1,38
1,54
1,37 | 0,895
0,985
1,120
1,015 | 0,405
0,395
0,420
0,355 | 0,413
0,467
0,420
0,447 | 0,444
0,501
0,538
0,494 | 3,60
4,35
4,35
4,25 | 3,05
3,68
3,70
3,61 | 0,60
0,67
0,65
0,64 |

() Les résultats entre parenthèses sont très douteux.

Tableau F₂

Evolution de quelques constituants des fruits d'un des régimes de l'arbre 101.36 rapporté aux poids frais et aux poids secs, de chacun des composants du fruit.

| Temps
en jours
avant ou
après
maturité | En grammes pour cent
grammes de pulpe
fraîche | | | En grammes pour cent
grammes de pulpe
sèche | | |
|--|---|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|
| | %
Pulpe
fruit | Eau
de la
pulpe | M.G.
de la
pulpe | Pulpe
sèche
deshuillée | Matières
grasses
de la pulpe | Pulpe
sèche
deshuillée |
| - 131 | 75,0
79,8 | 80,0
84,6 | - | (20,0)
(15,4) | - | - |
| - 111 | 72,6
68,0 | 85,6
85,3 | - | (14,4)
(14,7) | - | - |
| - 92 | 67,0
62,0 | 84,6
81,8 | - | (15,4)
(18,2) | - | - |
| - 77 | 60,8
61,5 | 82,7
83,0 | - | (17,3)
(17,0) | - | - |
| - 69 | 61,9
60,2 | 83,6
82,8 | - | (16,4)
(17,2) | - | - |
| - 61 | 60,8
58,8 | 83,1
82,8 | 0,2
0,2 | 16,6
16,9 | 1,30
1,30 | 98,7
93,0 |
| - 53 | 65,7
61,7 | 84,0
82,8 | 0,2
0,2 | 15,1
15,4 | 1,30
1,30 | 94,0
95,5 |
| 0 | 60,8
59,3
59,1
61,2 | 31,4
31,3
30,2
30,5 | 50,6
50,1
50,9
51,1 | 17,6
18,3
18,5
18,1 | 73,6
72,9
73,2
73,7 | 25,6
26,7
26,7
26,1 |

() Les résultats entre parenthèses sont en réalité des pourcentages du poids sec non déshuillé - assimilables à des poids secs déshuillés ou très pauvres en huile.

Tableau E₂ (suite et fin)

| Temps en jours avant ou après maturité | En grammes pour cent grammes de graine fraîche | | | En grammes pour 100 grammes de graine sèche | Graine sèche déshuilée | Eau de la coque Coque fraîche % |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | eau de la graine | Matières grasses de la graine | graine sèche déshuilée | grasses de la graine | Graine sèche déshuilée | |
| - 131 | - | - | - | - | - | 89,5 |
| - 111 | 98,2
97,8 | - | (1,8)
(2,2) | - | - | 83,3 |
| - 92 | 93,7
91,2 | 0,55
1,90 | 5,9
6,9 | 8,3
20,3 | 90,3
76,7 | 80,7
82,0 |
| - 77 | 78,8
78,6 | 6,75
7,70 | 14,3
13,8 | 31,5
35,4 | 67,5
64,0 | 57,0
53,1 |
| - 69 | 66,7
65,4 | 13,5
14,0 | 20,1
19,7 | 40,2
41,2 | 59,7
57,7 | 35,7
35,3 |
| - 61 | 56,5
51,1 | 18,6
21,9 | 21,0
26,6 | 44,8
45,2 | 50,6
52,0 | 31,1
31,5 |
| - 53 | - | - | - | - | - | 25,9
26,4 |
| 0 | 31,4
28,4
27,0
26,2 | 32,1
33,8
32,3
33,4 | 34,0
36,3
34,9
36,1 | 46,7
47,5
44,4
44,0 | 49,6
50,9
48,0
48,7 | 22,6
21,9
15,1
15,6
15,2
15,0 |

() Les résultats entre parenthèses sont en réalité des pourcentages de poids sec non deshuilé - assimilables à des poids secs deshuilés ou très pauvres en huile.

Tableau E₃

Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 101-36, en poids pour chacun des composants d'un fruit.

| Temps en jours avant ou après maturité. | En milligrammes pour la pulpe d'un fruit | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| -131 | 36,8 | - | 1,30
1,50 | 7,6
6,9 | 4,50
4,00 | 3,65
3,30 |
| -111 | 70,2
65,8 | 12,4
13,2 | 2,25
2,35 | 12,5
11,8 | 8,80
8,75 | 7,25
6,90 |
| -92 | 114,0
124,0 | 16,0
18,0 | 2,90
3,00 | 22,0
26,4 | 14,50
14,80 | 11,90
12,20 |
| -77 | 133,0
144,0 | 16,5
19,9 | 2,30
3,00 | 33,2
35,3 | 14,10
15,70 | 11,70
12,60 |
| -69 | 132,5
147,5 | 15,9
18,9 | 2,45
3,05 | 32,7
40,6 | 14,50
14,10 | 11,10
11,90 |
| -61 | 142,0
139,0 | 18,5
16,8 | 2,45
2,40 | 35,6
39,1 | 13,80
12,15 | 11,30
10,45 |
| -53 | 134,5
132,0 | 16,7
16,7 | 2,25
2,05 | 35,3
35,0 | 13,80
13,40 | 11,60
11,25 |
| 0 | 79,0
-
90,0 | 19,0
-
23,2 | 1,75
-
2,10 | 14,2
-
14,9 | 6,20
-
7,80 | 4,45
-
5,15 |

Tableau E₃ (suite)

| Temps
en jours
avant ou
après
maturité. | En milligrammes pour la coque d'un fruit . | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | Cendres. | N | P | K | Ca | Mg |
| - 131 | 8,5
10,1 | - | 0,340
0,380 | 3,50
3,05 | 0,43
0,50 | 0,36
0,46 |
| - 111 | 25,7
29,5 | - | 0,385
0,980 | 10,35
11,20 | 0,94
0,97 | 1,02
0,90 |
| - 92 | 41,3
38,4 | 12,7
14,4 | 1,210
0,920 | 13,00
13,85 | 1,02
0,72 | 0,97
0,97 |
| - 77 | 35,8
41,2 | 17,5
17,7 | 1,380
1,190 | 9,80
9,85 | 0,89
0,86 | 1,07
- |
| - 69 | 29,8
34,2 | 16,2
17,3 | 1,100
1,340 | 7,10
8,35 | 0,66
0,84 | 1,19
1,30 |
| - 61 | 26,5
34,6 | 16,3
16,5 | 0,945
1,220 | 5,10
5,40 | 0,62
0,77 | 1,30
1,44 |
| - 53 | 31,5
26,0 | 14,2
14,6 | 0,880
0,685 | 4,40
4,05 | 0,74
0,47 | 1,06
0,76 |
| 0 | 37,4
48,9 | 12,4
9,5 | 0,625
0,590 | 2,05
2,00 | 0,46
0,52 | 0,70
0,75 |

Tableau E₃ (suite et fin)

| Temps
en jours
avant ou
après
maturité | En milligrammes pour la graine d'un fruit . | | | | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Cendres. | N | P | K | Ca | Mg |
| - 131 | 1,12
1,24 | - | 0,014
0,011 | 0,275
0,320 | 0,215
0,230 | 0,062
0,066 |
| - 111 | 0,96
2,70 | - | 0,021
0,022 | 0,185
0,590 | 0,215
0,550 | 0,061
0,160 |
| - 92 | 7,00
10,00 | - | 0,110
0,250 | 2,15
3,20 | 0,835
1,015 | 0,300
0,575 |
| - 77 | 10,70
10,80 | - | 0,565
0,600 | 3,45
3,35 | 0,825
0,850 | 0,780
0,770 |
| - 69 | 10,70
11,96 | - | 0,825
0,975 | 2,60
3,30 | 0,805
0,935 | 0,810
1,010 |
| - 61 | 10,60
14,35 | - | 1,210
- | 2,85
3,20 | 0,895
1,110 | 0,960
1,290 |
| - 53 | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 16,10
16,90
14,00
15,80 | 9,50
8,90
10,65
9,45 | 0,580
1,160
0,740
0,870 | 3,55
4,40
4,50
4,40 | 0,750
0,805
0,860
0,860 | 1,170
1,260
1,340
1,330 |

Tableau E₄

Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 101.36 rapportés aux poids frais de chacun des composants d'un fruit.

| Temps en jours
avant ou après
maturité. | En grammes pour 1.000 grammes de pulpe
fraîche. | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| -131 | 11,3
10,8 | - | 0,550
0,430 | 2,35
2,05 | 1,40
1,15 | 1,10
1,00 |
| -111 | 10,3
9,4 | 1,82
1,35 | 0,330
0,330 | 1,85
1,70 | 1,30
1,25 | 1,05
1,00 |
| -92 | 12,2
14,2 | 1,71
2,06 | 0,310
0,340 | 2,25
3,05 | 1,55
1,70 | 1,30
1,40 |
| -77 | 14,7
15,1 | 1,82
2,08 | 0,310
0,315 | 3,65
3,70 | 1,55
1,65 | 1,30
1,30 |
| -69 | 14,5
15,2 | 1,74
1,97 | 0,270
0,315 | 3,60
4,20 | 1,60
1,45 | 1,20
1,25 |
| -61 | 15,1
15,0 | 1,97
1,81 | 0,260
0,260 | 3,60
4,20 | 1,45
1,30 | 1,25
1,15 |
| -53 | 14,1
14,5 | 1,70
1,84 | 0,235
0,230 | 3,70
3,85 | 1,45
1,45 | 1,20
1,25 |
| 0 | 9,6
-
9,7 | 2,34
-
2,51 | 0,210
-
0,225 | 1,75
-
1,60 | 0,75
-
0,85 | 0,545
-
0,560 |

Tableau F₄ (suite)

| Temps en jours
avant ou après
maturité | En grammes pour 1.000 grammes
de coque | | | | | |
|--|---|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| - 131 | 12,1
13,4 | - | 0,500
0,500 | 5,00
4,00 | 0,600
0,700 | 0,500
0,600 |
| - 111 | 10,6
10,1 | - | 0,365
0,335 | 4,30
3,85 | 0,400
0,350 | 0,425
0,310 |
| - 92 | 10,3
8,5 | 3,18
3,19 | 0,310
0,205 | 3,25
3,05 | 0,250
0,160 | 0,240
0,215 |
| - 77 | 7,5
8,4 | 3,67
3,62 | 0,290
0,240 | 2,65
2,00 | 0,190
0,180 | 0,220
.. |
| - 69 | 6,5
6,6 | 3,55
3,37 | 0,240
0,260 | 1,55
1,60 | 0,145
0,160 | 0,250
0,255 |
| - 61 | 5,4
6,6 | 3,33
3,16 | 0,195
0,235 | 1,65
1,05 | 0,125
0,150 | 0,265
0,275 |
| - 53 | 7,3
5,6 | 3,28
3,16 | 0,200
0,150 | 1,00
0,90 | 0,170
0,100 | 0,245
0,165 |
| 0 | 8,7
11,1 | 2,86
2,17 | 0,145
0,135 | 0,47
0,46 | 0,130
0,120 | 0,195
0,175 |

Tableau E₄ (suite et fin)

| Temps en jours
avant ou après
maturité. | En grammes pour 1.000 grammes de graine
fraîche. | | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| -131 | - | - | - | - | - | - |
| -111 | 4,3
6,0 | - | 0,10
0,05 | 0,90
1,30 | 1,10
1,20 | 0,30
0,40 |
| -92 | 12,7
11,75 | - | 0,20
0,29 | 3,90
3,80 | 1,50
1,20 | 0,55
0,65 |
| -77 | 10,30
10,00 | - | 0,55
0,55 | 3,30
3,10 | 0,80
0,80 | 0,75
0,70 |
| -69 | 10,60
10,00 | - | 0,80
0,80 | 2,55
2,75 | 0,60
0,80 | 0,80
0,85 |
| -61 | 8,90
11,20 | - | 1,00
- | 2,40
2,50 | 0,75
0,85 | 0,80
1,00 |
| -53 | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 12,40
12,20
9,10
11,50 | 7,30
6,40
6,90
6,90 | 0,45
0,85
0,50
0,65 | 2,75
3,20
2,95
3,20 | 0,60
0,60
0,55
0,65 | 0,90
0,90
0,85
0,95 |

Tableau E₅

Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 101.36 rapportés aux poids secs de chacun des composants du fruit.

| Temps en jours
avant ou après
maturité. | En grammes pour cent grammes de pulpe sèche. | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| - 131 | 5,95
6,80 | - | 0,275
0,275 | 1,17
1,23 | 0,695
0,735 | 0,560
0,615 |
| - 111 | 7,25
6,40 | 1,29
1,28 | 0,235
0,230 | 1,30
1,15 | 0,900
0,850 | 0,750
0,670 |
| - 92 | 7,85
7,85 | 1,10
1,14 | 0,200
0,190 | 1,52
1,54 | 1,000
0,940 | 0,820
0,770 |
| - 77 | 8,55
8,85 | 1,06
1,23 | 0,180
0,185 | 2,13
2,13 | 0,910
0,970 | 0,750
0,790 |
| - 69 | 8,85
8,95 | 1,06
1,14 | 0,165
0,185 | 2,13
2,45 | 0,970
0,850 | 0,740
0,720 |
| - 53 | 8,90
8,25 | 1,15
1,00 | 0,155
0,145 | 2,24
2,23 | 0,850
0,860 | 0,740
0,780 |
| 0 | 1,40
- | 0,34
- | 0,031
- | 0,255
- | 0,110
- | 0,080
- |
| | 1,40 | 0,36 | 0,033 | 0,235 | 0,120 | 0,080 |

Tableau E₅ (suite)

| Temps en jours
avant ou après
maturité. | En grammes pour cent grammes de coques | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Cendres | N | sèches.
P | K | Ca | Mg |
| - 131 | 12,40
8,10 | - | 0,480
0,305 | 5,00
2,45 | 0,600
0,400 | 0,515
0,370 |
| - 111 | 5,75
5,60 | - | 0,190
0,185 | 2,25
2,15 | 0,200
0,185 | 0,220
0,170 |
| - 92 | 2,30
1,80 | 0,735
0,675 | 0,070
0,045 | 0,75
0,65 | 0,060
0,035 | 0,055
0,045 |
| - 77 | 1,15
1,30 | 0,570
0,560 | 0,045
0,037 | 0,320
0,310 | 0,030
0,027 | 0,035
- |
| - 69 | 0,95
0,95 | 0,515
0,490 | 0,035
0,038 | 0,225
0,235 | 0,021
0,024 | 0,040
0,035 |
| - 61 | 0,75
0,90 | 0,450
0,430 | 0,026
0,032 | 0,140
0,140 | 0,017
0,020 | 0,035
0,040 |
| - 53 | 0,90
0,70 | 0,400
0,405 | 0,025
0,019 | 0,125
0,110 | 0,021
0,013 | 0,035
0,020 |
| 0 | 1,05
1,35
- | 0,325
0,260
- | 0,017
0,016
- | 0,055
0,055
- | 0,015
0,015
- | 0,021
0,021
- |

Tableau E₅ (suite et fin)

| Temps en jours
avant ou après
maturité. | En grammes pour cent grammes de graines sèches. | | | | | |
|---|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| - 131 | - | - | - | - | - | - |
| - 111 | 27,70
33,80 | - | 0,590
0,280 | 5,35
7,45 | 6,15
6,95 | 1,75
2,05 |
| - 92 | 19,60
13,00 | - | 0,310
0,320 | 5,95
4,15 | 2,30
1,30 | 0,85
0,75 |
| - 77 | 4,80
4,60 | - | 0,250
0,255 | 1,55
1,45 | 0,370
0,365 | 0,350
0,330 |
| - 69 | 3,10
2,90 | - | 0,240
0,240 | 0,76
0,81 | 0,235
0,230 | 0,240
0,250 |
| - 61 | 2,20
1,60 | - | 0,245
- | 0,58
0,51 | 0,180
0,180 | 0,195
0,210 |
| - 53 | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 1,80
1,70
1,25
1,55 | 1,06
0,91
0,95
0,93 | 0,065
0,115
0,065
0,085 | 0,41
0,44
0,40
0,44 | 0,085
0,080
0,075
0,085 | 0,130
0,130
0,120
0,130 |

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem.

2. The second part is devoted to a detailed analysis of the results.

3. The third part is devoted to a discussion of the conclusions.

4. The fourth part is devoted to a discussion of the results.

5. The fifth part is devoted to a discussion of the results.

6. The sixth part is devoted to a discussion of the results.

7. The seventh part is devoted to a discussion of the results.

8. The eighth part is devoted to a discussion of the results.

9. The ninth part is devoted to a discussion of the results.

10. The tenth part is devoted to a discussion of the results.

11. The eleventh part is devoted to a discussion of the results.

12. The twelfth part is devoted to a discussion of the results.

Tableau E
6

Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 101.36 rapportés aux poids secs deshuilés de la pulpe .

| Temps en jours
avant ou après
maturité | En grammes pour cent grammes de pulpe sèche
deshuilée. | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| - 131 | (5,95)
(6,80) | - | (0,275)
(0,275) | (1,17)
(1,28) | (0,695)
(0,735) | (0,560)
(0,615) |
| - 111 | (7,25)
(6,40) | (1,29)
(1,28) | (0,235)
(0,230) | (1,30)
(1,15) | (0,900)
(0,850) | (0,750)
(0,670) |
| - 92 | (7,85)
(7,85) | (1,10)
(1,14) | (0,200)
(0,190) | (1,52)
(1,54) | (1,000)
(0,940) | (0,820)
(0,770) |
| - 77 | (8,55)
(8,85) | (1,06)
(1,23) | (0,180)
(0,185) | (2,13)
(2,18) | (0,910)
(0,970) | (0,750)
(0,790) |
| - 69 | (8,85)
(9,95) | (1,06)
(1,14) | (0,165)
(0,185) | (2,18)
(2,45) | (0,970)
(0,850) | (0,740)
(0,720) |
| - 61 | 9,05
8,90 | 1,18
1,08 | 0,155
0,155 | 2,27
2,51 | 0,880
0,790 | 0,750
0,670 |
| - 53 | 9,30
8,80 | 1,12
1,11 | 0,155
0,140 | 2,45
2,33 | 0,960
0,890 | 0,805
0,750 |
| 0 | 5,50
-
-
5,40 | 1,32
-
-
1,39 | 0,120
-
-
0,125 | 0,99
-
-
0,89 | 0,430
-
-
0,470 | 0,310
-
-
0,310 |

() Les chiffres entre parenthèses sont en réalité rapportés aux poids secs. La teneur en huile de la pulpe et de la graine étant faible pour ces prélèvements, ces résultats sont très voisins de ceux rapportés aux poids secs deshuilés.

Tableau E₆ (suite et fin)

Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 101.36 rapportés aux poids secs deshuilés de la graine.

| Temps en jours
avant et après
maturité | En grammes pour cent grammes de graine sèche
deshuilée. | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg. |
| - 131 | - | - | - | - | - | - |
| - 111 | (27,7)
(33,8) | - | (0,590)
(0,280) | (5,35)
(7,45) | (6,15)
(6,95) | (1,75)
(2,05) |
| - 92 | 19,4
17,0 | - | 0,340
0,420 | 6,60
5,45 | 2,60
1,75 | 0,90
0,95 |
| - 77 | 7,10
7,20 | - | 0,380
0,400 | 2,30
2,25 | 0,55
0,56 | 0,52
0,51 |
| - 69 | 5,25
5,10 | - | 0,400
0,410 | 1,25
1,40 | 0,40
0,40 | 0,40
0,43 |
| - 61 | 4,20
4,25 | - | 0,480
- | 1,15
0,95 | 0,36
0,33 | 0,38
0,38 |
| - 53 | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 5,15
4,80
3,55
4,30 | 2,14
1,78
1,98
1,91 | 0,135
0,230
0,140
0,180 | 0,81
0,88
0,84
0,89 | 0,170
0,160
0,160
0,175 | 0,26
0,25
0,25
0,27 |

Tableau E₇

Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 101.36
rapportés à l'eau de chacun des composants du fruit.

| Jours avant ou
après
maturité. | En grammes pour mille grammes d'eau de la | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Cendres | P
pulpe. | K | Ca | Mg |
| - 131 | 14,0
13,0 | 0,70
0,50 | 2,90
2,40 | 1,75
1,40 | 1,40
1,15 |
| - 111 | 12,0
11,0 | 0,39
0,39 | 2,15
1,95 | 1,50
1,45 | 1,25
1,15 |
| - 92 | 14,5
17,5 | 0,37
0,42 | 2,80
3,70 | 1,85
2,10 | 1,50
1,70 |
| - 77 | 18,0
18,0 | 0,37
0,38 | 4,45
4,45 | 1,90
2,00 | 1,55
1,60 |
| - 69 | 17,5
18,5 | 0,32
0,38 | 4,30
5,05 | 1,90
1,75 | 1,45
1,50 |
| - 61 | 18,0
18,0 | 0,31
0,31 | 4,55
5,20 | 1,75
1,60 | 1,50
1,35 |
| - 53 | 17,0
17,5 | 0,28
0,28 | 4,40
4,65 | 1,70
1,75 | 1,45
1,50 |
| 0 | 30,5
-
31,0 | 0,66
-
0,73 | 5,45
-
5,30 | 2,40
-
2,70 | 1,70
-
1,85 |

Tableau E₇ (suite)

| Jours avant ou
après
maturité. | En grammes pour mille grammes d'eau de la
coque. | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Cendres | P | K | Ca | Mg |
| - 131 | 13,5
16,0 | 0,55
0,61 | 5,60
4,80 | 0,65
0,80 | 0,60
0,75 |
| - 111 | 13,0
12,5 | 0,45
0,40 | 5,30
4,70 | 0,45
0,42 | 0,52
0,38 |
| - 92 | 18,0
16,0 | 0,55
0,38 | 5,70
5,80 | 0,44
0,30 | 0,42
0,40 |
| - 77 | 21,0
24,0 | 0,81
0,68 | 5,80
5,70 | 0,53
0,51 | 0,62 |
| - 69 | 21,0
21,0 | 0,77
0,82 | 5,00
5,10 | 0,47
0,51 | 0,80
0,80 |
| - 61 | 21,0
25,0 | 0,76
0,92 | 4,00
3,90 | 0,48
0,57 | 1,02
1,04 |
| - 53 | 32,5
27,0 | 1,10
0,87 | 4,50
4,00 | 0,81
0,60 | 1,08
0,75 |
| 0 | 56,0
73,0 | 1,09
1,05 | 3,00
3,00 | 0,85
0,82 | 1,30
1,16 |

Tableau E₇ (suite et fin)

| Jours avant ou
après
maturité | En grammes pour mille grammes d'eau de la | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Cendres | P
graine. | K | Ca | Mg |
| - 131 | - | - | - | - | - |
| - 111 | { 4,80 }
{ 6,10 } | { 0,11 }
{ 0,05 } | { 0,95 }
{ 1,30 } | { 1,10 }
{ 1,25 } | { 0,30 }
{ 0,35 } |
| - 92 | { 13,5 }
{ 12,9 } | { 0,21 }
{ 0,32 } | { 4,35 }
{ 4,15 } | { 1,60 }
{ 1,30 } | { 0,60 }
{ 0,75 } |
| - 77 | 13,0
12,5 | 0,67
0,70 | 4,20
3,90 | 1,00
0,99 | 0,94
0,90 |
| - 69 | 16,0
15,0 | 1,22
1,21 | 3,80
4,10 | 1,20
1,15 | 1,20
1,25 |
| - 61 | 15,0
15,5 | 1,68
- | 4,00
4,90 | 1,25
1,70 | 1,35
2,00 |
| - 53 | - | - | - | - | - |
| 0 | 39,5
43,0
34,0
44,0 | 1,43
2,95
1,75
2,40 | 8,70
11,20
10,90
12,20 | 1,85
2,05
2,05
2,40 | 2,85
3,25
3,25
3,70 |

() Les résultats entre parenthèses sont douteux.

Tableau F₁

Evolution en poids pour un fruit de quelques constituants des fruits de l'un des régimes du palmier 17-37-436 (*)

| Date des prélèvements | Temps en jours avant ou après maturité. | Poids frais d'un fruit entier en grammes. | Poids frais | En grammes pour la pulpe d'un fruit. | | | |
|-----------------------|---|---|---------------|--------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | | | | Poids sec | Eau | Matières grasses | Poids sec deshuilé. |
| 15.1.1957 | - 120 | 6,75
6,70 | 5,75
5,70 | 0,625
0,625 | 5,10
5,65 | - | - |
| 30.1.1957 | - 105 | 10,50
9,75 | 7,15
6,65 | 0,780
0,715 | 6,40
5,95 | - | - |
| 15.2.1957 | - 89 | 11,70
11,20 | 7,05
6,95 | 0,870
0,840 | 6,20
6,10 | - | - |
| 2.3.1957 | - 74 | 11,45
11,00 | 6,65
7,25 | 0,715
0,730 | 5,95
6,45 | - | - |
| 19.3.1957 | - 57 | 11,35
10,60 | 6,50
6,55 | 0,730
0,725 | 5,75
5,85 | - | - |
| 3.4.1957 | - 42 | 12,00
11,90 | 6,60
6,90 | 0,735
0,720 | 5,85
6,15 | - | - |
| 13.4.1957 | - 27 | 12,35
12,55 | 7,30
7,80 | 1,375
1,595 | 5,95
6,20 | 0,480
0,655 | 0,860
0,905 |
| 29.4.1957 | - 16 | 13,45
14,25 | 8,80
9,20 | 2,590
3,470 | 6,20
5,70 | 1,450
2,230 | 1,085
1,220 |
| 9.5.1957 | - 6 | 15,45
15,85 | 9,95
11,05 | 4,970
5,460 | 4,95
5,60 | 3,620
3,880 | 1,390
1,530 |
| 13.5.1957 | - 2 | 13,80
14,55 | 9,10
9,65 | 4,990
5,350 | 4,10
4,30 | 3,540
3,970 | 1,380
1,330 |
| 18.5.1957 | + 3 | 15,35
13,80 | 10,05
9,10 | 6,080
5,230 | 4,00
3,85 | 4,550
3,970 | 1,500
1,240 |

(*) -- Moyenne de 10 fruits pour chaque échantillon des prélèvements -120, -105, -89, -74, -57, -42, de 5 fruits pour les échantillons des autres prélèvements.

Tableau F₁ (suite et fin)

| Temps en jours avant ou après maturité. | En grammes pour la graine d'un fruit | | | | | En grammes pour la coque d'un fruit. | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|--|
| | Poids frais | Poids sec | Eau | Matières grasses | Poids sec deshuilé | Poids frais | Poids sec | Eau | |
| - 120 | (0,095)
(0,115) | (0,0017)
(0,0017) | (0,093)
(0,115) | - | - | (0,92)
(0,92) | 0,085
0,081 | (0,830)
(0,835) | |
| - 105 | (0,680)
(0,580) | (0,021)
(0,021) | (0,660)
(0,560) | - | - | (2,67)
(2,51) | 0,548
0,518 | (2,120)
(2,000) | |
| - 89 | (0,740)
(0,650) | (0,0639)
(0,0565) | (0,675)
(0,595) | - | - | (3,90)
(3,55) | 1,21
1,07 | (2,680)
(2,490) | |
| - 74 | 0,850
0,625 | 0,175
0,153 | 0,685
0,510 | 0,073
0,060 | 0,081
0,048 | 3,30
3,05 | 1,57
1,26 | 2,250
1,810 | |
| - 57 | 0,885
0,730 | 0,450
0,332 | 0,437
0,396 | 0,256
0,200 | 0,189
0,128 | 3,80
3,10 | 2,07
1,64 | 1,720
1,480 | |
| - 42 | 0,980
0,880 | 0,720
0,630 | 0,263
0,248 | 0,326
0,290 | 0,384
0,334 | 4,10
3,90 | 2,72
2,54 | 1,390
1,380 | |
| - 27 | 1,010
0,870 | 0,755
0,700 | 0,255
0,172 | 0,371
0,342 | 0,359
0,325 | 3,80
3,75 | 2,91
2,84 | 0,900
0,890 | |
| - 16 | 0,775
1,005 | 0,605
0,775 | 0,169
0,233 | 0,272
0,378 | 0,298
0,382 | 3,70
3,85 | 2,97
3,09 | 0,740
0,760 | |
| - 6 | 1,165
0,800 | 0,925
0,620 | 0,240
0,178 | 0,462
0,296 | 0,444
0,316 | 4,10
3,75 | 3,34
3,09 | 0,760
0,680 | |
| - 2 | 1,120
1,270 | 0,870
0,985 | 0,254
0,284 | 0,430
0,496 | 0,417
0,477 | 3,45
3,45 | 2,87
2,88 | 0,570
0,580 | |
| + 3 | 1,230
1,280 | 0,935
0,995 | 0,294
0,284 | 0,465
0,494 | 0,451
0,491 | 3,90
3,25 | 3,25
2,68 | 0,650
0,590 | |

() Les résultats entre parenthèses sont douteux.

Tableau F₂

Evolution de quelques constituants des fruits d'un des régimes de l'arbre 17.37 436
rapportés aux poids frais et aux poids secs de chacun des composants du fruit.

| Temps en
jours
avant ou
après
maturité | Pulpe
du fruit
% | En grammes pour 100
grammes pulpe fraîche | | En grammes pour 100 grammes
pulpe sèche | | |
|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| | | Eau
de la
pulpe | M.G.
de la
pulpe | Pulpe
sèche
deshuillée | M.G.
de la
pulpe | Pulpe sèche
deshuillée |
| - 120 | 84,7
84,5 | 89,1
89,0 | - | (10,9)
(11,0) | - | - |
| - 105 | 68,0
68,5 | 89,0
89,3 | - | (11,0)
(10,7) | - | - |
| - 89 | 60,4
62,3 | 87,7
87,9 | - | (12,3)
(12,1) | - | - |
| - 74 | 57,8
65,9 | 89,2
89,1 | - | (10,8)
(10,9) | - | - |
| - 57 | 58,2
61,9 | 98,8
88,9 | - | (11,2)
(11,1) | - | - |
| - 42 | 54,9
58,0 | 88,9
89,5 | - | (11,1)
(10,5) | - | - |
| - 27 | 59,3
62,1 | 81,2
79,5 | 6,6
8,4 | 11,8
11,6 | 35,0
41,0 | 62,6
56,9 |
| - 16 | 65,3
64,7 | 70,4
62,2 | 16,5
24,3 | 12,4
13,3 | 56,0
64,3 | 41,9
35,2 |
| - 6 | 64,2
69,7 | 50,0
50,7 | 36,5
35,1 | 14,0
13,8 | 72,8
69,7 | 27,9
28,0 |
| - 2 | 65,7
67,0 | 45,0
45,2 | 39,2
41,2 | 15,2
13,8 | 70,8
74,3 | 27,6
24,9 |
| + 3 | 65,6
66,0 | 39,6
42,2 | 45,3
43,8 | 14,9
13,7 | 74,8
76,0 | 24,7
23,7 |

Tableau F₂ (suite et fin)

| Temps en jours avant ou après maturité. | En gramme pour 100 grammes de la graine fraîche | | En gramme pour 100 grammes de la graine sèche | | Eau de la coque
coque fraîche
% |
|---|---|--------------------|---|-------------------|---------------------------------------|
| | Eau de la graine | M.G. de la graine. | Graine sèche deshuilée | M.G. de la graine | Graine sèche deshuilée |
| - 120 | 98,2
98,5 | - | - | - | 90,8
91,2 |
| - 105 | 96,9
96,4 | - | - | - | 79,7
79,4 |
| - 89 | 91,5
91,5 | - | - | - | 68,7
70,0 |
| - 74 | 79,4
81,6 | 9,2
9,5 | 9,5
7,7 | 44,8
52,0 | 46,3
41,8 |
| - 57 | 49,3
54,3 | 28,9
27,4 | 21,9
17,6 | 57,0
60,0 | 42,0
38,5 |
| - 42 | 26,7
28,2 | 33,2
33,0 | 39,1
38,0 | 45,3
46,0 | 53,4
53,0 |
| - 27 | 25,2
19,8 | 36,8
39,4 | 35,6
37,4 | 49,2
49,0 | 49,2
46,6 |
| - 16 | 21,8
23,1 | 38,7
37,9 | 35,1
37,6 | 49,2
49,4 | 44,8
48,8 |
| - 6 | 22,5
22,2 | 38,1
39,5 | 39,7
37,0 | 48,1
50,7 | 50,0
47,7 |
| - 2 | 22,7
22,4 | 38,4
37,2 | 37,2
38,8 | 49,3
48,4 | 47,8
50,3 |
| + 3 | 23,9
22,9 | 37,9
38,6 | 36,7
38,3 | 49,7
49,6 | 48,1
49,3 |
| | | | | | 16,6
16,0 |

Tableau F₃

Evolution de quelques constituants minéraux des fruits de l'un des régimes de l'arbre
17,37 436 en poids pour chacun des composants d'un fruit.

| Temps en jours
avant ou après
maturité. | En milligrammes pour la pulpe d'un fruit. | | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| - 120 | 74,0
73,9 | - | 1,60
1,60 | 15,0
15,3 | 7,50
7,50 | 4,40
4,60 |
| - 105 | 99,4
89,5 | - | 1,85
1,70 | 22,2
21,0 | 9,50
8,50 | 5,80
5,35 |
| - 89 | 107,0
108,0 | - | 1,60
1,60 | 27,5
25,6 | 10,30
9,85 | 6,65
6,70 |
| - 74 | - | 8,25
8,60 | 1,20
1,25 | 28,0
29,3 | 9,35
8,60 | 6,55
6,60 |
| - 57 | - | 6,70
7,00 | 1,00
0,95 | 28,2
29,2 | 7,50
7,85 | 6,35
6,30 |
| - 42 | - | 8,10
7,20 | 0,97
0,98 | 27,0
26,8 | 7,80
7,10 | 6,45
6,10 |
| - 27 | - | 9,20
9,00 | 1,15
1,15 | 25,4
26,8 | 7,60
6,95 | 5,75
5,10 |
| - 16 | - | 13,30
13,10 | - | 22,6
24,5 | 7,00
6,60 | 5,20
4,80 |
| - 6 | - | 17,40
20,20 | 2,10
2,10 | 23,8
26,2 | 6,65
6,90 | 4,85
4,90 |
| - 2 | - | 16,90
16,30 | 1,80
1,75 | 19,7
19,2 | 5,50
5,10 | 3,90
3,85 |
| + 3 | - | 16,10
13,60 | 1,70
1,65 | 18,7
18,9 | 5,50
5,10 | 3,15
3,50 |

Tableau F₃ (suite)

| Temps en jours
avant ou après
maturité. | En milligrammes pour la coque d'un fruit. | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| - 120 | 14,8
14,4 | - | 0,280
0,265 | 4,70
4,65 | 0,530
0,510 | 0,350
0,300 |
| - 105 | 38,3
35,3 | - | 0,825
0,820 | 11,25
11,15 | 0,880
0,910 | 0,800
0,800 |
| - 89 | 56,5
52,0 | - | 1,150
0,975 | 17,20
15,40 | 1,290
1,290 | 1,300
1,100 |
| - 74 | - | 8,90
7,20 | 0,885
0,875 | 12,70
14,60 | 0,680
0,710 | 1,180
1,040 |
| - 57 | - | 10,50
8,70 | 1,180
0,900 | 11,00
8,85 | 0,765
0,525 | 1,220
0,965 |
| - 42 | - | 8,80
10,15 | 0,755
0,910 | 5,65
5,55 | 0,430
0,460 | 0,840
0,890 |
| - 27 | - | 8,45
8,80 | 0,520
0,450 | 3,20
2,60 | 0,280
0,225 | 0,640
0,525 |
| - 16 | - | 8,65
8,95 | 0,310
0,355 | 2,30
2,60 | 0,230
0,250 | 0,490
0,550 |
| - 6 | - | 9,35
8,65 | 0,275
0,270 | 2,40
2,05 | 0,205
0,190 | 0,425
0,460 |
| - 2 | - | 8,00
8,05 | 0,230
0,220 | 1,80
1,80 | 0,165
0,150 | 0,335
0,325 |
| + 3 | - | 8,95
7,50 | 0,275
0,260 | 2,00
2,20 | 0,160
0,150 | 0,325
0,350 |

Tableau F₃ (suite et fin)

| Temps en jours
avant ou après
maturité. | En milligrammes pour la graine d'un fruit. | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| - 120 | 0,2
0,4 | - | 0,005
0,004 | 0,120
0,145 | 0,040
0,050 | 0,027
0,025 |
| - 105 | 5,8
5,5 | - | 0,055
0,045 | 1,465
1,375 | 0,550
0,500 | 0,160
0,140 |
| - 89 | 8,5
10,9 | - | 0,325
0,265 | 3,150
2,820 | 0,750
0,560 | 0,375
0,280 |
| - 74 | - | 2,20
1,40 | 0,270
0,200 | 2,460
1,860 | -
- | -
- |
| - 57 | - | 5,00
3,70 | 0,380
0,350 | 1,970
1,750 | 0,680
0,535 | 0,860
0,645 |
| - 42 | - | 8,30
6,70 | 0,845
0,840 | 2,300
2,140 | 0,770
0,590 | 1,050
0,920 |
| - 27 | - | 7,90
7,80 | 0,455
0,435 | 2,710
2,300 | 0,710
0,690 | 0,980
0,895 |
| - 16 | - | 6,40
7,30 | 0,400
0,500 | 2,220
2,730 | 0,615
0,660 | 0,805
0,955 |
| - 6 | - | 9,20
7,20 | -
- | 3,500
2,310 | 0,690
0,620 | 1,140
0,865 |
| - 2 | - | 9,50
8,80 | 0,560
0,630 | 3,190
3,320 | 0,750
0,740 | 1,200
1,250 |
| + 3 | - | 9,70
10,00 | 0,680
0,705 | 3,560
3,760 | 0,825
0,890 | 1,190
1,320 |

Tableau F₄

Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 17.37 436
 rapportés aux poids frais de chacun des composants du fruit.

| Temps en jours
avant ou après
maturité. | En grammes pour 1.000 grammes de pulpe
fraîche | | | | | |
|---|---|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| - 120 | 11,0
10,9 | - | 0,280
0,280 | 2,60
2,70 | 1,30
1,32 | 0,780
0,810 |
| - 105 | 14,0
13,5 | - | 0,260
0,260 | 3,10
3,15 | 1,32
1,27 | 0,810
0,800 |
| - 89 | 15,2
15,5 | - | 0,230
0,230 | 3,90
3,65 | 1,46
1,41 | 0,945
0,960 |
| - 74 | - | 1,24
1,19 | 0,180
0,170 | 4,20
4,10 | 1,26
1,19 | 0,990
0,910 |
| - 57 | - | 1,03
1,07 | 0,150
0,145 | 4,35
4,45 | 1,15
1,20 | 0,980
0,960 |
| - 42 | - | 1,21
1,04 | 0,150
0,145 | 4,10
3,90 | 1,98
1,03 | 0,980
0,885 |
| - 27 | - | 1,25
1,15 | 0,160
0,150 | 3,45
3,45 | 1,04
0,89 | 0,785
0,655 |
| - 16 | - | 1,51
1,43 | - | 2,55
2,75 | 0,80
0,72 | 0,590
0,520 |
| - 6 | - | 1,75
1,83 | 0,200
0,190 | 2,40
2,35 | 0,67
0,62 | 0,490
0,440 |
| - 2 | - | 1,86
1,69 | 0,195
0,180 | 2,15
2,00 | 0,61
0,54 | 0,430
0,400 |
| + 3 | - | 1,61
1,50 | 0,150
0,180 | 1,85
2,10 | 0,55
0,56 | 0,310
0,385 |

Tableau F₄ (suite)

| Temps en jours
avant ou après
maturité. | En grammes pour 1.000 grammes de coque fraîche | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| - 120 | 16,0
16,0 | - | 0,310
0,280 | 4,70
5,05 | 0,580
0,560 | 0,380
0,300 |
| - 105 | 14,0
14,0 | - | 0,310
0,325 | 4,20
4,45 | 0,330
0,365 | 0,300
0,320 |
| - 89 | 14,5
14,5 | - | 0,290
0,275 | 4,40
4,30 | 0,330
0,360 | 0,335
0,310 |
| - 74 | - | 2,30
2,30 | 0,230
0,285 | 3,30
4,75 | 0,230
0,230 | 0,310
0,340 |
| - 57 | - | 2,75
2,80 | 0,310
0,290 | 2,90
2,85 | 0,200
0,165 | 0,320
0,310 |
| - 42 | - | 2,15
2,60 | 0,200
0,230 | 1,35
1,40 | 0,105
0,118 | 0,205
0,225 |
| - 27 | - | 2,20
2,35 | 0,135
0,120 | 0,85
0,70 | 0,075
0,060 | 0,170
0,140 |
| - 16 | - | 2,30
2,33 | 0,082
0,092 | 0,60
0,65 | 0,060
0,065 | 0,130
0,145 |
| - 6 | - | 2,30
2,33 | 0,067
0,071 | 0,60
0,55 | 0,050
0,050 | 0,105
0,120 |
| - 2 | - | 2,30
2,20 | 0,067
0,060 | 0,52
0,49 | 0,047
0,041 | 0,097
0,089 |
| + 3 | - | 2,30
2,30 | 0,070
0,079 | 0,51
0,67 | 0,041
0,045 | 0,083
0,105 |

Tableau F₄ (suite et fin)

| Temps en jours
avant ou après
maturité | En grammes pour 1.000 grammes de graine fraîche | | | | | |
|--|---|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| - 120 | 2,0
4,0 | - | 0,050
0,030 | 1,30
1,20 | 0,410
0,440 | 0,280
0,210 |
| - 105 | 9,0
10,0 | - | 0,080
0,080 | 2,25
2,35 | 0,810
0,860 | 0,235
0,240 |
| - 89 | 12,0
17,5 | - | 0,440
0,410 | 4,25
4,35 | 1,010
0,860 | 0,510
0,430 |
| - 74 | - | 2,60
2,20 | 0,320
0,320 | 2,90
3,00 | -
- | -
- |
| - 57 | - | 5,60
5,10 | 0,425
0,485 | 2,25
2,40 | 0,770
0,740 | 0,970
0,890 |
| - 42 | - | 8,50
7,60 | 0,860
0,960 | 2,35
2,45 | 0,780
0,670 | 1,070
1,050 |
| - 27 | - | 7,90
9,00 | 0,450
0,500 | 2,70
2,65 | 0,940
0,990 | 0,970
1,030 |
| - 16 | - | 8,20
7,20 | 0,520
0,500 | 2,75
2,70 | 0,800
0,650 | 1,040
0,950 |
| - 6 | - | 7,90
9,00 | -
- | 3,00
2,90 | 0,590
0,770 | 0,980
1,080 |
| - 2 | - | 8,50
6,90 | 0,500
0,490 | 2,85
2,60 | 0,650
0,580 | 1,070
0,985 |
| + 3 | - | 7,90
7,80 | 0,550
0,550 | 2,90
2,95 | 0,670
0,695 | 0,965
1,030 |

Tableau F₅

Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 17.37 436
rapportés aux poids secs de chacun des composants du fruit

| Temps en jours
avant ou après
maturité. | En grammes pour 100 grammes de pulpe sèche. | | | | | |
|---|---|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| - 120 | 11,8
11,6 | - | 0,255
0,255 | 2,40
2,45 | 1,19
1,19 | 0,705
0,735 |
| - 105 | 12,7
12,5 | - | 0,235
0,240 | 2,85
2,95 | 1,22
1,20 | 0,745
0,750 |
| - 89 | 12,3
12,9 | - | 0,185
0,190 | 3,15
3,05 | 1,19
1,17 | 0,765
0,795 |
| - 74 | - | 1,16
1,13 | 0,170
0,160 | 3,90
3,80 | 1,17
1,10 | 0,920
0,845 |
| - 57 | - | 0,92
0,96 | 0,135
0,130 | 3,85
4,01 | 1,03
1,08 | 0,870
0,865 |
| - 42 | - | 1,10
1,00 | 0,130
0,135 | 4,10
3,90 | 1,06
0,99 | 0,880
0,845 |
| - 27 | - | 0,67
0,56 | 0,085
0,075 | 1,85
1,70 | 0,550
0,435 | 0,420
0,320 |
| - 16 | - | 0,52
0,38 | - | 0,85
0,70 | 0,270
0,190 | 0,200
0,140 |
| - 6 | - | 0,35
0,37 | 0,042
0,038 | 0,48
0,48 | 0,135
0,125 | 0,098
0,090 |
| - 2 | - | 0,34
0,31 | 0,036
0,030 | 0,38
0,36 | 0,110
0,095 | 0,078
0,072 |
| + 3 | - | 0,26
0,26 | 0,028
0,032 | 0,31
0,36 | 0,090
0,110 | 0,052
0,067 |

Tableau F₅ (suite)

| Temps en jours
avant ou après
maturité. | En grammes pour 100 grammes de coque sèche | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| - 120 | 17,40
17,10 | - | 0,335
0,315 | 5,55
5,75 | 0,630
0,600 | 0,420
0,380 |
| - 105 | 7,00
6,80 | - | 0,150
0,160 | 2,05
2,15 | 0,160
0,175 | 0,145
0,155 |
| - 89 | 4,70
4,85 | - | 0,094
0,094 | 1,42
1,44 | 0,125
0,120 | 0,105
0,105 |
| - 74 | - | 0,570
0,610 | 0,0565
0,0695 | 0,93
1,01 | 0,0560
0,0560 | 0,0750
0,0825 |
| - 57 | - | 0,510
0,530 | 0,0370
0,0550 | 0,530
0,545 | 0,0365
0,0315 | 0,0590
0,0590 |
| - 42 | - | 0,325
0,400 | 0,0285
0,0360 | 0,210
0,220 | 0,0105
0,0118 | 0,0205
0,0225 |
| - 27 | - | 0,290
0,310 | 0,0180
0,0160 | 0,110
0,092 | 0,0075
0,0060 | 0,0170
0,0140 |
| - 16 | - | 0,290
0,230 | 0,0105
0,0115 | 0,078
0,084 | 0,0061
0,0065 | 0,0130
0,0145 |
| - 6 | - | 0,280
0,280 | 0,0082
0,0086 | 0,072
0,067 | 0,0050
0,0050 | 0,0105
0,0122 |
| - 2 | - | 0,280
0,280 | 0,0080
0,0076 | 0,062
0,062 | 0,0047
0,0041 | 0,0097
0,0088 |
| + 3 | - | 0,275
0,280 | 0,0070
0,0079 | 0,061
0,082 | 0,0041
0,0045 | 0,0083
0,00105 |

Tableau F₅ (suite et fin)

| Temps en jours
avant ou après
maturité. | En grammes pour 100 grammes de graine sèche. | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| - 120 | 11,7
23,4 | - | 0,285
0,220 | 7,20
7,40 | 2,30
3,10 | 1,600
1,500 |
| - 105 | 27,6
26,2 | - | 0,250
0,215 | 7,00
6,55 | 2,60
2,40 | 0,760
0,670 |
| - 89 | 21,5
30,8 | - | 0,510
0,470 | 4,95
5,00 | 1,18
1,00 | 0,590
0,495 |
| - 74 | - | 1,25
0,90 | 0,155
0,130 | 1,40
1,22 | - | - |
| - 57 | - | 1,10
1,10 | 0,085
0,105 | 0,440
0,525 | 0,155
0,160 | 0,190
0,195 |
| - 42 | - | 1,15
1,05 | 0,115
0,135 | 0,320
0,300 | 0,120
0,095 | 0,145
0,145 |
| - 27 | - | 1,05
1,10 | 0,060
0,060 | 0,360
0,330 | 0,070
0,080 | 0,130
0,128 |
| - 16 | - | 1,05
0,95 | 0,065
0,065 | 0,365
0,350 | 0,100
0,085 | 0,135
0,125 |
| - 6 | - | 1,05
1,15 | - | 0,380
0,370 | 0,075
0,100 | 0,123
0,140 |
| - 2 | - | 1,10
0,90 | 0,064
0,064 | 0,360
0,335 | 0,085
0,075 | 0,137
0,127 |
| + 3 | - | 1,05
1,00 | 0,072
0,071 | 0,380
0,380 | 0,090
0,080 | 0,127
0,132 |

Tableau F
6

Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre 17.37 436 rapportés aux poids secs déshuilés de la pulpe .

| Temps en jours
avant ou après
maturité | En grammes pour 100 grammes de pulpe sèche deshuilée. | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| - 120 | {11,8}
{11,6} | - | {0,255}
{0,255} | {2,40}
{2,45} | {1,19}
{1,19} | {0,705}
{0,735} |
| - 105 | {12,7}
{12,5} | - | {0,235}
{0,240} | {2,85}
{2,95} | {1,22}
{1,20} | {0,745}
{0,750} |
| - 89 | {12,3}
{12,9} | - | {0,185}
{0,190} | {3,15}
{3,05} | {1,19}
{1,17} | {0,765}
{0,795} |
| - 74 | - | {1,16}
{1,13} | {0,170}
{0,160} | {3,90}
{3,80} | {1,17}
{1,10} | {0,920}
{0,845} |
| - 57 | - | {0,921}
{0,96} | {0,135}
{0,130} | {3,85}
{4,00} | {1,03}
{1,08} | {0,870}
{0,865} |
| - 42 | - | {1,10}
{1,00} | {0,130}
{0,135} | {4,10}
{3,90} | {1,06}
{0,99} | {0,880}
{0,845} |
| - 27 | - | 1,07
0,99 | 0,135
0,130 | 3,05
2,95 | 0,880
0,770 | 0,670
0,560 |
| - 16 | - | 1,23
1,07 | - | 2,10
2,00 | 0,650
0,540 | 0,480
0,395 |
| - 6 | - | 1,25
1,32 | 0,150
0,135 | 1,70
1,70 | 0,475
0,450 | 0,350
0,320 |
| - 2 | - | 1,22
1,24 | 0,130
0,130 | 1,43
1,44 | 0,400
0,385 | 0,285
0,290 |
| + 3 | - | 1,07
1,10 | 0,115
0,135 | 1,25
1,52 | 0,370
0,410 | 0,210
0,285 |

() Les résultats entre parenthèses sont en réalité rapportés aux poids secs. La teneur en huile de la pulpe et de la graine étant faible pour ces prélèvements, ces résultats sont très voisins de ceux qui seraient rapportés aux poids secs deshuilés.

The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is argued that a knowledge of the past is essential for a full understanding of the present. The author then goes on to discuss the various factors that have shaped the development of the United States, including the role of the government, the influence of the economy, and the impact of the culture.

In the second part of the paper, the author examines the role of the government in the development of the United States. It is argued that the government has played a central role in the shaping of the nation, from the early days of the colonies to the present. The author then discusses the various ways in which the government has influenced the development of the country, including through its policies, its actions, and its institutions.

The third part of the paper discusses the influence of the economy on the development of the United States. It is argued that the economy has been a major factor in the shaping of the nation, from the early days of the colonies to the present. The author then discusses the various ways in which the economy has influenced the development of the country, including through its policies, its actions, and its institutions.

Finally, the author discusses the impact of the culture on the development of the United States. It is argued that the culture has been a major factor in the shaping of the nation, from the early days of the colonies to the present. The author then discusses the various ways in which the culture has influenced the development of the country, including through its policies, its actions, and its institutions.

Tableau F₆ ((suite et fin))

Evolution de quelques constituants minéraux des fruits d'un des régimes de l'arbre
17.37 436 rapportés aux poids secs deshuilés de la graine.

| Temps en jours
avant ou après
maturité. | En grammes pour 100 grammes de graine sèche deshuilée. | | | | | |
|---|--|--------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg |
| - 120 | (11,7)
(23,4) | - | (0,285)
(0,280) | (7,20)
(7,40) | (2,30)
(3,10) | (1,600)
(1,500) |
| - 105 | (27,6)
(26,2) | - | (0,250)
(0,215) | (7,00)
(6,55) | (2,60)
(2,40) | (0,760)
(0,670) |
| - 89 | (21,5)
(20,3) | - | (0,510)
(0,430) | (4,95)
(5,00) | (1,18)
(1,00) | (0,590)
(0,495) |
| - 74 | - | 2,70
2,90 | 0,335
0,415 | 3,10
3,90 | - | - |
| - 57 | - | 2,65
2,90 | 0,200
0,275 | 1,05
1,35 | 0,360
0,420 | 0,440
0,505 |
| - 42 | - | 2,15
2,00 | 0,220
0,230 | 0,600
0,615 | 0,200
0,180 | 0,275
0,275 |
| - 27 | - | 2,20
2,40 | 0,125
0,135 | 0,760
0,710 | 0,195
0,210 | 0,275
0,275 |
| - 16 | - | 2,15
1,90 | 0,135
0,130 | 0,745
0,715 | 0,205
0,175 | 0,270
0,250 |
| - 6 | - | 2,05
2,25 | - | 0,790
0,730 | 0,155
0,195 | 0,255
0,275 |
| - 2 | - | 2,30
2,10 | 0,135
0,130 | 0,765
0,695 | 0,180
0,155 | 0,290
0,260 |
| + 3 | - | 2,15
2,05 | 0,150
0,145 | 0,790
0,765 | 0,185
0,180 | 0,265
0,270 |

() Les résultats entre parenthèses sont en réalité rapportés aux poids secs. La teneur en huile de la pulpe et de la graine étant faible pour ces prélèvements, ces résultats sont très voisins de ceux qui seraient rapportés aux poids secs deshuilés.

Tableau F₇

Evolution de quelques constituants minéraux du fruit d'un des régimes de l'arbre 17.37 436
rapportés à l'eau de chacun des composants du fruit.

| Jours avant ou
après maturité | En grammes pour 1.000 grammes d'eau de la pulpe | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | Cendres | P | K | Ca | Mg |
| - 120 | 14,5
14,5 | 0,310
0,310 | 2,95
3,05 | 1,45
1,50 | 0,860
0,910 |
| - 105 | 15,5
15,0 | 0,290
0,290 | 3,50
3,55 | 1,50
1,45 | 0,910
0,900 |
| - 89 | 17,3
17,6 | 0,260
0,260 | 4,55
4,15 | 1,65
1,60 | 1,075
1,090 |
| - 74 | - | 0,200
0,190 | 4,70
4,60 | 1,40
1,35 | 1,100
1,020 |
| - 57 | - | 0,170
0,160 | 4,90
5,00 | 1,30
1,35 | 1,100
1,080 |
| - 42 | - | 0,165
0,160 | 4,00
4,35 | 1,35
1,15 | 1,090
0,990 |
| - 27 | - | 0,195
0,190 | 4,30
4,30 | 1,30
1,10 | 0,970
0,825 |
| - 16 | - | - | 3,70
4,30 | 1,20
1,15 | 0,840
0,840 |
| - 6 | - | 0,340
0,370 | 4,80
4,65 | 1,35
1,25 | 0,980
0,875 |
| - 2 | - | 0,435
0,400 | 4,80
4,45 | 1,35
1,20 | 0,955
0,900 |
| + 3 | - | 0,430
0,430 | 4,70
4,90 | 1,40
1,30 | 0,795
0,910 |

Tableau F₇ (suite)

| Jours avant ou
après maturité | En grammes pour 1.000 grammes d'eau de la coque | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | Cendres | P | K | Ca | Mg |
| - 120 | 18,0
17,0 | 0,340
0,320 | 5,70
5,55 | 0,650
0,610 | 0,420
0,360 |
| - 105 | 18,0
17,5 | 0,390
0,410 | 5,30
5,60 | 0,415
0,455 | 0,380
0,400 |
| - 89 | 21,0
21,0 | 0,425
0,390 | 6,40
6,20 | 0,480
0,520 | 0,485
0,440 |
| - 74 | - | 0,395
0,480 | 5,65
8,15 | 0,390
0,390 | 0,525
0,575 |
| - 57 | - | 0,690
0,610 | 6,40
5,00 | 0,440
0,350 | 0,710
0,655 |
| - 42 | - | 0,440
0,660 | 4,00
4,00 | 0,310
0,335 | 0,600
0,640 |
| - 27 | - | 0,580
0,510 | 3,60
2,95 | 0,315
0,250 | 0,710
0,580 |
| - 16 | - | 0,420
0,480 | 3,15
3,40 | 0,310
0,330 | 0,650
0,725 |
| - 6 | - | 0,360
0,395 | 3,15
3,05 | 0,270
0,275 | 0,560
0,670 |
| - 2 | - | 0,405
0,370 | 3,10
3,10 | 0,290
0,260 | 0,590
0,560 |
| + 3 | - | 0,420
0,440 | 3,05
3,70 | 0,250
0,250 | 0,500
0,590 |

Tableau F₇ (suite et fin)

| Jours avant ou après maturité | En grammes pour 1.000 grammes d'eau de la graine | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Cendres | P | K | Ca | Mg |
| - 120 | {2,0
4,0} | {0,050
0,035} | {1,30
1,25} | {0,40
0,45} | {0,290
0,215} |
| - 105 | {9,0
10,0} | {0,080
0,080} | {2,15
2,45} | {0,85
0,90} | {0,240
0,250} |
| - 89 | {12,0
17,5} | {0,500
0,450} | {4,65
4,75} | {1,10
0,95} | {0,550
0,470} |
| - 74 | - | 0,400
0,390 | 3,60
3,65 | - | - |
| - 57 | - | 0,860
0,390 | 4,50
4,55 | 1,55
1,35 | 1,95
1,65 |
| - 42 | - | 3,200
3,400 | 8,75
8,60 | 2,90
2,40 | 4,00
3,70 |
| - 27 | - | 1,800
2,550 | 10,60
13,30 | 2,80
4,00 | 3,85
5,20 |
| - 16 | - | 2,350
2,150 | 13,10
11,70 | 3,65
2,85 | 4,75
4,10 |
| - 6 | - | - | 14,60
13,00 | 2,85
3,50 | 4,75
4,10 |
| - 2 | - | 2,200
2,220 | 12,60
11,70 | 3,15
2,90 | 4,70
4,40 |
| + 3 | - | 2,460
2,490 | 12,10
13,25 | 2,80
3,15 | 4,05
4,65 |

() Les résultats entre parenthèses sont particulièrement douteux.

() Les résultats entre parenthèses sont particulièrement douteux.

Tableaux se rapportant au chapitre III.

- G₁ - Résultats moyens par arbre de la "Parcelle 36".
Catégorie NORMAUX. pages 54 et 55.
- G₂ - Résultats moyens par arbre de la "Parcelle 36".
Catégorie CHETIFS. page 56.
- G₃ - Résultats moyens par arbre de la "Parcelle 36".
Catégorie VIGoureux. page 57.
- H₁ - Résultats moyens par arbre de l'étude interorigines.
Origine YANGAMBI. page 58.
- H₂ - Résultats moyens par arbre de l'étude interorigines.
Origine POBE. page 59.
- H₃ - Résultats moyens par arbre de l'étude interorigines.
Origine SOCFIN. page 60.
- J₁ - Caractéristiques des échantillons prélevés en vue
d'analyses minérales comparatives entre le fruit et la
foliole. page 61.
- J₂ - Etude comparative de la composition minérale de la pulpe
et de la foliole. Résultats rapportés aux poids secs.
pages 62 et 63.
- J₃ - Etude comparative de la composition minérale de la pulpe
et de la foliole. Pourcentage des éléments K, Ca, Mg,
rapportés à la somme K + Ca + Mg.
Page 64.
- J₄ - Etude comparative de la composition minérale de la pulpe
et de la foliole. Analyses de la pulpe rapportées aux
poids frais et aux poids d'eau.
Page 65.
- J₅ - Etude comparative de la composition minérale de la pulpe
et de la foliole. Autres caractéristiques des arbres
étudiés. Page 66.

Tableau G₁ (suite et fin)

Résultats moyens par arbre de la "Parcelle 36"
Catégorie NORMAUX.

| N°
de
l'arbre | Années
1952 à 1954 | | Du 15 Novembre 1955 au 15 Novembre 1956 | | | | Huile
de la pulpe
kg. |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | Production
totale
kg. | Nombre
de
régimes | Production
totale
kg. | Nombre
de
régimes | %
Pulpe
Fruit | %Eau/Pulpe fraîche
Moyenne | |
| 65 | 127 | 8 | 74,0 | 3 | 62,7 | 33,6 | 49,4 |
| 71 | 166 | 12 | 168,0 | 11 | 52,1 | 44,0 | 39,0 |
| 72 | 172 | 8 | 191,5 | 9 | 59,5 | 46,1 | 36,9 |
| 73 | 134 | 8 | 209,5 | 8 | 63,0 | 44,5 | 38,5 |
| 75 | 162 | 10 | 144,5 | 7 | 84,2 | 37,8 | 46,2 |
| 76 | 29 | 3 | 111,0 | 4 | 63,8 | 39,7 | 43,3 |
| 78 | 201 | 17 | 113,5 | 6 | 54,1 | 37,6 | 47,4 |
| 79 | 281 | 16 | 155,5 | 7 | 53,2 | 40,2 | 42,8 |
| 83 | 140 | 8 | 125,5 | 7 | 68,6 | 39,0 | 44,0 |
| 95 | 148 | 7 | 86,0 | 3 | 63,9 | 43,3 | 39,7 |
| 96 | 150 | 8 | 87,0 | 4 | 72,0 | 47,8 | 35,2 |
| 97 | 129 | 5 | 142,0 | 4 | 66,7 | 47,6 | 35,4 |
| 99 | 230 | 7 | 102,5 | 3 | 67,7 | 41,3 | 41,7 |
| 100 | 186 | 10 | 54,5 | 3 | 57,6 | 35,2 | 47,8 |
| 107 | 235 | 15 | 71,5 | 3 | 51,4 | 34,0 | 49,0 |
| 109 | 278 | 10 | 231,5 | 7 | 73,6 | 42,4 | 40,6 |
| 110 | 138 | 8 | 129,5 | 6 | 65,6 | 44,9 | 38,1 |
| 116 | 89 | 5 | 134,5 | 3 | 66,9 | 33,7 | 49,3 |
| 126 | 140 | 7 | 108,0 | 3 | 67,6 | 38,8 | 44,2 |

Tableau G²

Résultats moyens par arbre de la "Parcelle 36" - Catégorie "CHETIFS"

Années
1952 à 1954

Du 15 Novembre 1955 au 15 Novembre 1956

| N°
de
l'arbre | Production
totale
kg. | Nombre
de
régimes | Production
totale
kg. | Nombre
de
régimes | %
Pulpe
Fruit | %Eau/Pulpe fraîche | | M.G./Pulpe Fraîche
calculé | Huile
de la pulpe
kg. |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Moyenne | $\bar{\sigma}$ | | |
| 3 | 127 | 11 | 95,0 | 5 | 64,7 | 52,0 | 4,74 | 2,12 | 12,4 |
| 6 | 64 | 9 | 42,5 | 3 | 61,1 | 56,9 | 4,40 | 2,54 | 4,5 |
| 10 | 233 | 10 | 140,0 | 10 | 64,0 | 41,6 | 3,08 | 0,97 | 24,2 |
| 12 | 126 | 5 | 65,0 | 3 | 66,5 | 42,8 | 3,63 | 4,98 | 11,7 |
| 13 | 178 | 7 | 70,0 | 5 | 68,5 | 41,8 | 6,75 | 3,02 | 12,7 |
| 18 | 115 | 12 | 103,0 | 9 | 61,0 | 46,7 | 6,60 | 2,20 | 15,6 |
| 21 | 39 | 6 | 39,0 | 2 | 60,0 | 38,6 | 0,64 | 0,45 | 6,3 |
| 23 | 83 | 8 | 54,0 | 4 | 62,1 | 40,1 | 2,78 | 1,39 | 9,4 |
| 26 | 49 | 5 | 16,5 | 1 | 67,5 | 42,5 | - | - | 3,0 |
| 29 | 223 | 26 | 100,0 | 9 | 48,5 | 45,2 | 2,98 | 0,99 | 12,0 |
| 34 | 247 | 10 | 176,5 | 6 | 57,6 | 40,5 | 5,63 | 2,30 | 28,2 |
| 36 | 74 | 5 | 82,5 | 4 | 66,4 | 48,9 | 7,14 | 3,57 | 4,0 |
| 38 | 0 | 0 | 33,5 | 4 | 63,5 | 54,0 | 8,59 | 4,30 | 12,2 |
| 39 | 80 | 10 | 63,5 | 5 | 64,6 | 47,8 | 4,23 | 1,89 | 9,5 |
| 40 | 66 | 4 | 47,5 | 3 | 66,7 | 38,0 | 5,15 | 2,96 | 9,3 |
| 41 | 125 | 9 | 36,5 | 2 | 60,6 | 42,6 | 3,46 | 2,45 | 5,8 |
| 45 | 176 | 99 | 35,0 | 2 | 62,4 | 46,0 | 6,80 | 4,80 | 5,3 |
| 47 | 91 | 8 | 64,0 | 5 | 64,9 | 42,3 | 3,93 | 1,76 | 11,1 |
| 51 | 161 | 14 | 98,5 | 10 | 60,9 | 60,1 | 11,95 | 3,78 | 9,1 |
| 58 | 36 | 9 | 30,5 | 7 | 59,1 | 64,3 | 13,20 | 5,00 | 2,2 |
| 59 | 115 | 11 | 60,0 | 4 | 67,7 | 42,5 | 3,68 | 1,84 | 10,6 |
| 60 | 163 | 12 | 107,0 | 5 | 69,5 | 35,9 | 3,28 | 1,64 | 22,6 |
| 66 | 119 | 11 | 30,0 | 2 | 70,1 | 38,4 | 3,40 | 2,40 | 6,0 |
| 68 | 59 | 10 | 17,5 | 2 | 61,4 | 44,1 | 5,80 | 4,10 | 2,7 |
| 80 | 82 | 6 | 20,0 | 1 | 66,1 | 36,3 | - | - | 4,0 |
| 84 | 28 | 5 | 24,0 | 3 | 66,3 | 42,5 | 1,60 | 0,92 | 4,2 |
| 87 | 108 | 10 | 75,0 | 5 | 54,3 | 49,0 | 2,59 | 1,15 | 9,1 |
| 94 | 26 | 4 | 41,0 | 4 | 63,3 | 60,9 | 5,36 | 2,68 | 3,8 |
| 105 | 116 | 6 | 102,0 | 5 | 58,3 | 49,0 | 6,51 | 2,92 | 13,2 |
| 111 | 146 | 7 | 61,5 | 3 | 64,7 | 56,5 | 6,04 | 3,49 | 7,0 |
| 114 | 72 | 66 | 49,0 | 3 | 65,0 | 68,2 | 18,60 | 10,70 | 3,2 |
| 119 | 161 | 9 | 105,0 | 5 | 63,5 | 47,5 | 7,48 | 3,34 | 15,4 |
| 121 | 84 | 9 | 58,0 | 4 | 61,2 | 51,5 | 6,95 | 3,47 | 7,3 |

Tableau G₃

Résultats moyens par arbre de la parcelle 36 - Catégorie "VIGOREUX"

| N°
de
l'arbre | Années
1952 à 1954 | | Du 15 Novembre 1955 au 15 Novembre 1956 | | | | M. G./Pulpe fraîche
calculé | Huile
de la
pulpe
kg. |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Production
totale
kg. | Nombre
de
régimes | Production
totale
kg. | Nombre
de
régimes | %
Pulpe
Fruit | %Eau/Pulpe fraîche
Moyenne | σ σ m | |
| 7 | 166 | 5 | 41,5 | 1 | 67,0 | 34,6 | - | 8,8 |
| 14 | 219 | 8 | 120,0 | 4 | 68,8 | 37,8 | 2,82 | 24,3 |
| 22 | 271 | 17 | 134,0 | 7 | 82,5 | 35,6 | 1,42 | 34,0 |
| 28 | 236 | 7 | 188,5 | 7 | 66,6 | 38,2 | 3,94 | 36,4 |
| 31 | 251 | 11 | 108,0 | 4 | 57,1 | 38,8 | 1,68 | 17,8 |
| 32 | 41 | 2 | 130,0 | 4 | 66,3 | 40,8 | 3,98 | 23,7 |
| 35 | 164 | 15 | 156,0 | 7 | 53,5 | 41,8 | 3,13 | 22,4 |
| 43 | 170 | 11 | 142,0 | 6 | 53,6 | 39,4 | 5,00 | 21,4 |
| 44 | 174 | 6 | 121,0 | 5 | 48,2 | 38,0 | 3,79 | 17,0 |
| 54 | 200 | 7 | 149,0 | 4 | 65,6 | 36,7 | 2,95 | 29,4 |
| 8 | 260 | 11 | 147,0 | 5 | 50,4 | 39,0 | 5,10 | 24,4 |
| 88 | 115 | 6 | 106,5 | 3 | 67,2 | 46,5 | 7,90 | 17,0 |
| 92 | 192 | 7 | 152,0 | 4 | 46,9 | 37,5 | 2,77 | 21,0 |
| 98 | 146 | 8 | 68,5 | 4 | 55,8 | 38,1 | 4,50 | 11,1 |
| 101 | 173 | 5 | 121,5 | 3 | 63,7 | 32,3 | 1,45 | 25,3 |
| 106 | 247 | 13 | 170,0 | 7 | 52,7 | 41,2 | 6,92 | 41,8 |
| 125 | 266 | 11 | 176,5 | 7 | 63,3 | 41,9 | 5,40 | 29,8 |

24,3

Résultats moyens par arbre de
l'étude interorigines ORIGINE "YANGAMBI"

| Croise-
ment N° | Arbre
N° | Production en kg de régimes | | | | %Eau/Pulpe fraîche | | | %
Pulpe
Fruit | %
Fruits
normaux
régime |
|--------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|------|------|---------------------|----------------------------------|
| | | 3 mois
avant
estimée | Pendant
analyses
mesurée | 3 mois
après
estimée | Totale | Moyenne | 5 | 5 m | | |
| 65 | 5-3 | 0 | 39 | 0 | 39 | 35,1 | 3,36 | 1,37 | 59,0 | 68,8 |
| | 9-5 | 16 | 32 | 24 | 72 | 48,3 | 7,35 | 3,68 | 65,5 | 64,9 |
| | 9-9 | 27 | 44 | 9 | 80 | 36,6 | 2,76 | 1,23 | 84,3 | 62,7 |
| | 17-1 | 35 | 61 | 16 | 112 | 31,2 | 0,90 | 0,45 | 79,4 | 84,0 |
| | 17-4 | 0 | 72 | 39 | 111 | 44,0 | 2,64 | 1,18 | 46,9 | 69,0 |
| | 17-5 | 40 | 45 | 8 | 93 | 33,5 | 2,11 | 0,86 | 72,8 | 63,2 |
| | 17-8 | 0 | 48 | 16 | 64 | 34,0 | 1,96 | 0,89 | 51,7 | 62,8 |
| 68 | 1-1 | 45 | 60 | 3 | 108 | 34,3 | 5,19 | 2,32 | 75,5 | 59,5 |
| | 1-2 | 0 | 87 | 0 | 87 | 34,0 | 3,91 | 1,48 | 71,4 | 53,9 |
| | 1-3 | 22 | 71 | 0 | 93 | 33,6 | 2,22 | 0,99 | 63,5 | 52,8 |
| | 1-5 | 0 | 73 | 16 | 89 | 32,6 | 3,00 | 1,50 | 72,9 | 59,6 |
| | 1-6 | 14 | 62 | 0 | 76 | 28,7 | 1,69 | 0,85 | 56,1 | 60,5 |
| | 10-2 | 20 | 113 | 32 | 155 | 32,7 | 1,43 | 0,64 | 78,2 | 57,3 |
| | 10-4 | 22 | 68 | 11 | 91 | 29,2 | 1,85 | 0,83 | 69,5 | 47,1 |
| 70 | 7-3 | 12 | 50 | 28 | 90 | 38,0 | 4,08 | 1,67 | 80,8 | 44,5 |
| | 7-4 | 24 | 51 | 0 | 75 | 37,3 | 3,67 | 1,64 | 76,6 | 61,9 |
| | 7-5 | 52 | 38 | 0 | 90 | 36,3 | 2,39 | 0,98 | 77,1 | 40,5 |
| | 7-7 | 42 | 72 | 8 | 122 | 34,0 | 2,70 | 1,21 | 81,7 | 53,2 |
| | 7-8 | 80 | 42 | 0 | 122 | 38,6 | 1,58 | 0,70 | 84,9 | 52,9 |
| | 7-10 | 56 | 85 | 28 | 169 | 41,6 | 2,92 | 1,30 | 82,6 | 66,1 |
| | 7-11 | 16 | 58 | 16 | 90 | 39,6 | 1,21 | 0,54 | 82,0 | 50,3 |
| 71 | 8-4 | 28 | 80 | 36 | 144 | 31,1 | 0,82 | 0,41 | 76,8 | 64,1 |
| | 8-8 | 0 | 81 | 0 | 81 | 32,6 | 1,57 | 0,90 | 79,9 | 65,3 |
| | 8-9 | 30 | 60 | 0 | 90 | 35,8 | 1,12 | 0,65 | 79,6 | 52,4 |
| | 8-10 | 36 | 62 | 8 | 106 | 33,4 | 4,48 | 2,00 | 61,9 | 62,2 |
| | 8-11 | 0 | 96 | 0 | 96 | 37,7 | 6,14 | 2,32 | 55,0 | 56,6 |
| | 18-5 | 0 | 55 | 28 | 83 | 41,0 | 2,60 | 1,06 | 56,0 | 56,3 |
| | 18-6 | 10 | 51 | 20 | 81 | 30,1 | 3,34 | 1,49 | 78,1 | 64,2 |
| 73 | 6-3 | 0 | 79 | 20 | 99 | 36,5 | 5,89 | 2,40 | 71,4 | 65,1 |
| | 6-10 | 12 | 97 | 24 | 133 | 36,8 | 2,02 | 0,90 | 77,6 | 60,8 |
| | 24-3 | 45 | 53 | 3 | 101 | 38,4 | 3,32 | 1,25 | 76,9 | 54,9 |
| | 24-4 | 12 | 139 | 0 | 151 | 43,4 | 3,34 | 1,37 | 75,9 | 61,5 |
| | 24-5 | 55 | 76 | 0 | 131 | 39,3 | 3,08 | 1,54 | 78,4 | 60,0 |
| | 24-8 | 92 | 36 | 0 | 108 | 40,3 | 4,45 | 2,57 | 82,0 | 78,5 |
| | 24-9 | 0 | 59 | 10 | 69 | 33,8 | 2,94 | 1,20 | 79,0 | 55,1 |

Tableau H₂

Résultats moyens par arbre de l'étude interorigines
ORIGINE "POBE"

| Croise-
ment N° | Arbre N° | Production en kg de régimes | | | | %eau/Pulpe fraîche | | | | %
pulpe
fruit | %
Fruits
normaux
régime |
|--------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|------|------|--|---------------------|----------------------------------|
| | | 3 mois
avant
estimée | pendant
analyses
mesurée | 3 mois
après
estimée | Totale | Moyenne | σ | σ m | | | |
| 1 | 436 39-1 | 40 | 63 | 30 | 133 | 46,9 | 4,82 | 1,98 | | 39,8 | 62,0 |
| | 39-2 | 40 | 71 | 70 | 181 | 44,0 | 3,64 | 1,63 | | 32,4 | 60,5 |
| | 39-3 | 40 | 41 | 16 | 97 | 38,7 | 2,91 | 1,30 | | 54,3 | 58,7 |
| | 39-13 | 50 | 45 | 5 | 100 | 38,2 | 4,24 | 1,60 | | 54,7 | 59,6 |
| | 39-16 | 42 | 30 | 12 | 84 | 41,5 | 2,94 | 1,32 | | 56,9 | 54,0 |
| | 39-17 | 32 | 41 | 20 | 93 | 39,8 | 7,20 | 2,72 | | 59,5 | 56,7 |
| | 39-21 | 44 | 57 | 30 | 131 | 36,6 | 1,71 | 0,77 | | 59,0 | 51,7 |
| 2 | 436 36-6 | 78 | 38 | 0 | 116 | 35,2 | 3,32 | 1,36 | | 67,0 | 38,4 |
| | 36-11 | 0 | 57 | 35 | 92 | 33,1 | 3,20 | 1,43 | | 90,3 | 50,1 |
| | 36-15 | 14 | 29 | 28 | 71 | 32,3 | 1,39 | 0,62 | | 58,6 | 54,9 |
| | 36-19 | 45 | 57 | 55 | 157 | 35,3 | 2,33 | 0,95 | | 70,9 | 49,6 |
| | 36-21 | 36 | 40 | 30 | 106 | 35,9 | 1,19 | 0,53 | | 64,7 | 57,3 |
| | 36-23 | 28 | 38 | 8 | 74 | 38,0 | 1,15 | 0,51 | | 54,7 | 62,3 |
| | 36-26 | 66 | 19 | 59 | 137 | 36,4 | 1,77 | 1,25 | | 38,6 | 54,5 |
| 68 | 427 9-3 | 16 | 66 | 24 | 106 | 37,1 | 1,73 | 0,77 | | 53,7 | 51,3 |
| | 9-13 | 28 | 78 | 25 | 131 | 35,7 | 2,69 | 1,20 | | 60,1 | 55,8 |
| | 9-21 | 0 | 68 | 24 | 92 | 39,5 | 0,90 | 0,40 | | 51,4 | 50,0 |
| | 9-23 | 30 | 56 | 16 | 102 | 34,9 | 1,75 | 0,78 | | 57,2 | 59,1 |
| | 9-24 | 6 | 82 | 36 | 124 | 44,9 | 1,83 | 0,82 | | 36,1 | 54,8 |
| | 9-26 | 35 | 56 | 15 | 106 | 38,7 | 4,75 | 1,94 | | 52,4 | 49,6 |
| | 14-4 | 35 | 41 | 0 | 76 | 42,5 | 6,65 | 3,32 | | 43,5 | 56,8 |
| | 14-9 | 22 | 53 | 27 | 102 | 40,6 | 2,86 | 1,28 | | 59,8 | 53,1 |
| | 14-10 | 20 | 49 | 42 | 111 | 37,4 | 2,50 | 1,11 | | 58,1 | 57,7 |
| | 14-14 | 27 | 54 | 9 | 91 | 41,4 | 3,96 | 1,77 | | 51,5 | 51,6 |
| | 14-20 | 20 | 57 | 42 | 119 | 42,1 | 4,61 | 2,06 | | 58,1 | 54,0 |
| | 14-21 | 20 | 38 | 25 | 83 | 41,7 | 2,12 | 0,94 | | 50,1 | 43,9 |
| | 14-24 | 0 | 64 | 14 | 78 | 36,9 | 3,00 | 1,34 | | 53,3 | 40,7 |
| 69 | 427 10-9 | 51 | 59 | 32 | 142 | 34,2 | 2,62 | 1,07 | | 40,2 | 57,5 |
| | 10-10 | 35 | 50 | 9 | 94 | 33,6 | 1,35 | 0,60 | | 60,1 | 53,9 |
| | 10-12 | 42 | 50 | 32 | 124 | 36,1 | 1,24 | 0,55 | | 52,6 | 62,6 |
| | 10-13 | 49 | 61 | 24 | 134 | 31,3 | 1,61 | 0,72 | | 60,3 | 58,2 |
| | 10-19 | 0 | 72 | 40 | 112 | 37,0 | 4,07 | 1,82 | | 51,8 | 58,3 |
| | 10-23 | 36 | 37 | 24 | 97 | 36,2 | 2,17 | 0,97 | | 58,2 | 44,3 |
| | 10-25 | 21 | 75 | 28 | 124 | 37,0 | 3,74 | 1,53 | | 54,5 | 54,8 |

Tableau H₃

Résultats moyens par arbre de l'étude interorigines
ORIGINE "SOCFIN"

| Croise-
ment N° | Arbre N° | Production en kg de régimes | | | | %Eau/Pulpe fraîche | | | % | % | |
|--------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|----------|------------|----------------|-----------------------------|------|
| | | 3 mois
avant
estimée | Pendant
analyses
mesurée | 3 mois
après
estimée | Totale | Moyenne | σ | σ_m | Pulpe
fruit | Fruits
normaux
Régime | |
| 1365 | 436 | 15-5 | 26 | 98 | 40 | 164 | 48,5 | 5,91 | 2,42 | 54,9 | 49,0 |
| | | 15-13 | 0 | 124 | 44 | 169 | 49,3 | 6,38 | 2,61 | 47,0 | 63,3 |
| | | 15-14 | 0 | 110 | 15 | 125 | 42,4 | 3,10 | 1,55 | 54,1 | 60,9 |
| | | 34-1 | 50 | 101 | 24 | 175 | 44,7 | 1,67 | 0,75 | 53,1 | 56,0 |
| | | 34-3 | 0 | 88 | 56 | 144 | 43,0 | 5,53 | 2,08 | 50,8 | 39,6 |
| | | 34-25 | 70 | 48 | 0 | 118 | 42,0 | 4,90 | 2,45 | 55,1 | 55,2 |
| | | 34-26 | 0 | 91 | 20 | 111 | 44,6 | 7,00 | 2,80 | 54,0 | 67,4 |
| 1372 | 436 | 14-4 | 30 | 80 | 22 | 132 | 43,4 | 6,75 | 2,76 | 51,5 | 58,2 |
| | | 14-6 | 72 | 36 | 36 | 144 | 52,2 | 2,06 | 1,45 | 64,4 | 62,1 |
| | | 14-8 | 16 | 103 | 25 | 144 | 42,1 | 2,00 | 0,90 | 59,0 | 60,7 |
| | | 14-9 | 14 | 101 | 50 | 165 | 38,9 | 3,10 | 1,55 | 57,8 | 58,8 |
| | | 33-2 | 0 | 76 | 0 | 76 | 40,0 | 3,42 | 1,40 | 57,1 | 56,6 |
| | | 33-14 | 0 | 63 | 13 | 76 | 40,5 | 1,08 | 0,62 | 55,1 | 67,5 |
| | | 33-15 | 39 | 73 | 33 | 145 | 44,3 | 5,32 | 2,66 | 51,0 | 58,3 |
| | | 33-19 | 54 | 62 | 0 | 116 | 38,5 | 1,35 | 0,60 | 57,5 | 60,9 |
| 33-26 | 88 | 50 | 0 | 138 | 43,3 | 7,15 | 3,20 | 52,8 | 56,0 | | |
| 1405 | 436 | 17-2 | 96 | 80 | 9 | 185 | 32,3 | 2,68 | 1,34 | 63,8 | 61,0 |
| | | 17-4 | 101 | 88 | 0 | 190 | 41,4 | 4,90 | 3,45 | 57,2 | 66,0 |
| | | 17-6 | 0 | 110 | 30 | 140 | 38,9 | 0,29 | 0,15 | 68,0 | 65,5 |
| | | 17-8 | 0 | 119 | 42 | 151 | 37,0 | 1,06 | 0,43 | 46,1 | 62,9 |
| | | 17-10 | 0 | 143 | 30 | 173 | 40,2 | 1,95 | 0,87 | 69,0 | 55,4 |
| | | 17-11 | 0 | 93 | 15 | 108 | 41,0 | 1,68 | 0,84 | 49,9 | 60,0 |
| | | 17-12 | 48 | 114 | 60 | 222 | 36,3 | 2,90 | 1,18 | 67,2 | 65,0 |
| | | 17-17 | 18 | 57 | 20 | 95 | 30,9 | 0,71 | 0,50 | 72,5 | 43,5 |
| 17-18 | 28 | 112 | 0 | 140 | 36,0 | 2,54 | 1,04 | 57,8 | 59,7 | | |
| 1449 | 436 | 37-3 | 0 | 178 | 39 | 217 | 40,1 | 3,76 | 1,42 | 57,6 | 65,0 |
| | | 37-9 | 8 | 47 | 0 | 55 | 32,1 | 2,26 | 1,18 | 64,5 | 66,2 |
| | | 37-10 | 36 | 117 | 15 | 168 | 34,8 | 5,21 | 2,34 | 63,6 | 60,8 |
| | | 37-14 | 61 | 56 | 5 | 102 | 37,9 | 1,59 | 0,71 | 59,9 | 63,7 |
| | | 37-15 | 84 | 72 | 26 | 182 | 35,6 | 1,30 | 0,58 | 63,5 | 60,2 |
| | | 37-24 | 39 | 59 | 15 | 113 | 34-1 | 2,51 | 1,45 | 67,8 | 51,9 |
| | | 37-25 | 56 | 42 | 0 | 98 | 32-7 | 2,40 | 1,07 | 58,9 | 60,6 |
| | | 37-26 | 50 | 74 | 24 | 148 | 31-4 | 0,75 | 0,44 | 65,6 | 59,9 |

Caractéristiques des échantillons prélevés en vue d'analyses minérales comparatives entre le fruit et la foliole.

| N° arbi-
- traire | Arbre analysé
Origine. | Numéro | | Date du prélèvement pour | |
|----------------------|---------------------------|--------|-------|--------------------------|--------------------|
| | | | | L'analyse des fruits | L'analyse foliaire |
| 1 | YANGAMBI | GP3 | 1-6 | 28.5.56 (*) | 8.6.56 |
| 2 | " | " | 7-3 | 28.5.56 (*) | " |
| 3 | " | " | 10-2 | 31.5.56 (*) | " |
| 4 | " | " | 10-4 | 6.6.56 (*) | " |
| 5 | " | " | 7-7 | 15.6.56 | 13.7.56 |
| 6 | " | " | 9-9 | 22.6.56 | " |
| 7 | " | " | 17-8 | 22.6.56 | " |
| 8 | " | " | 6-10 | 5.7.56 | " |
| 9 | " | " | 7-4 | 5.7.56 | " |
| 10 | " | " | 24-4 | 9.7.56 | " |
| 11 | POBE | 427 | 14-9 | 30.5.56 (*) | 8.6.56 |
| 12 | " | 436 | 36-15 | 30.5.56 (*) | " |
| 13 | " | 427 | 14-4 | 4.6.56 (*) | " |
| 14 | " | " | 9-13 | 11.6.56 | " |
| 15 | " | " | 14-24 | 11.6.56 | 29.6.56 |
| 16 | " | " | 9-23 | 13.6.56 | " |
| 17 | " | " | 10-13 | 13.6.56 | " |
| 18 | " | " | 14-14 | 13.6.56 | " |
| 19 | " | 436 | 39-13 | 13.6.56 | " |
| 20 | " | " | 36-26 | 22.6.56 | " |
| 21 | SOCFIN | 436 | 34-26 | 31.5.56 (*) | 8.6.56 |
| 22 | " | " | 37-3 | 7.6.56 (*) | 29.6.56 |
| 23 | " | " | 17-12 | 11.6.56 (*) | " |
| 24 | " | " | 37-26 | 11.6.56 (*) | " |
| 25 | " | " | 17-18 | 15.6.56 (*) | " |
| 26 | " | " | 33-2 | 15.6.56 | " |
| 27 | " | " | 15-5 | 21.6.56 | " |
| 28 | " | " | 37-9 | 21.6.56 | " |
| 29 | " | " | 34-3 | 22.6.56 | " |
| 30 | " | " | 14-8 | 26.6.56 | " |

(*) Analyse complète sur 2 échantillons pour ces prélèvements.

Tableau J₂

Etude comparative de la composition minérale de la pulpe de la violette. Résultats rapportés aux poids secs.

| N° arbitraire | En % de la pulpe sèche et deshuilée. | | | K | Ca | Mg |
|---------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Cendres | N | P | | | |
| 1 | 3,80 | 1,45 | 0,125 | 0,680 | 0,235 | 0,185 |
| 2 | 7,65 | 1,45 | 0,165 | 0,835 | 0,510 | 0,475 |
| 3 | 5,85 | 1,39 | 0,139 | 0,740 | 0,290 | 0,472 |
| 4 | 5,35 | 1,80 | 0,157 | 0,730 | 0,450 | 0,288 |
| 5 | 6,30 | 1,56 | 0,127 | 0,660 | 0,265 | 0,335 |
| 6 | 5,75 | 1,27 | 0,126 | 0,975 | 0,385 | 0,308 |
| 7 | 4,70 | 1,36 | 0,154 | 0,880 | 0,240 | 0,286 |
| 8 | 5,90 | 1,66 | 0,158 | 0,990 | 0,450 | 0,377 |
| 9 | 7,60 | 1,55 | 0,152 | 0,860 | 0,350 | 0,366 |
| 10 | 5,90 | 1,63 | 0,140 | 0,910 | 0,350 | 0,410 |
| Moyenne | 5,88 | 1,515 | 0,144 | 0,826 | 0,353 | 0,350 |
| 11 | 7,20 | 1,10 | 0,140 | 0,580 | 0,360 | 0,316 |
| 12 | 7,35 | 1,30 | 0,170 | 0,775 | 0,320 | 0,340 |
| 13 | 6,45 | 1,25 | 0,150 | 0,595 | 0,430 | 0,592 |
| 14 | 5,80 | 1,19 | 0,117 | 0,625 | 0,255 | 0,398 |
| 15 | 6,10 | 1,55 | 0,138 | 0,740 | 0,360 | 0,367 |
| 16 | 6,85 | 1,15 | 0,126 | 0,515 | 0,240 | 0,412 |
| 17 | 7,20 | 1,08 | 0,141 | 0,500 | 0,280 | 0,374 |
| 18 | 8,00 | 1,04 | 0,121 | 0,630 | 0,480 | 0,322 |
| 19 | 8,65 | 1,30 | 0,153 | 0,570 | 0,430 | 0,564 |
| 20 | 7,30 | 1,10 | 0,156 | 0,650 | 0,440 | 0,429 |
| Moyenne | 7,09 | 1,205 | 0,141 | 0,618 | 0,359 | 0,411 |
| 21 | 7,90 | 1,34 | 0,119 | 1,498 | 0,590 | 0,468 |
| 22 | 6,25 | 1,30 | 0,132 | 1,110 | 0,560 | 0,332 |
| 23 | 6,15 | 1,32 | 0,112 | 1,050 | 0,355 | 0,315 |
| 24 | 5,05 | 1,26 | 0,115 | 0,890 | 0,405 | 0,244 |
| 25 | 5,65 | 1,46 | 0,135 | 1,150 | 0,435 | 0,333 |
| 26 | 5,50 | 1,32 | 0,118 | 1,200 | 0,360 | 0,294 |
| 27 | 7,50 | 1,34 | 0,132 | 1,530 | 0,465 | 0,475 |
| 28 | 4,80 | 1,27 | 0,129 | 1,100 | 0,265 | 0,270 |
| 29 | 6,80 | 1,52 | 0,143 | 1,490 | 0,380 | 0,372 |
| 30 | 6,35 | 1,31 | 0,115 | 1,200 | 0,410 | 0,354 |
| Moyenne | 6,20 | 1,345 | 0,124 | 1,220 | 0,422 | 0,346 |

Tableau J₂ (suite et fin)

| En % de la foliole sèche | | | | | | | | | | N° arbitraire |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|-------|------|-----------|-----------|---------|-------|---------------|
| N | Feuille P | de rang K | N°9 Ca | Mg | N | Feuille P | de rang K | N°17 Ca | Mg | |
| 2,42 | 0,167 | 0,811 | 0,754 | 0,459 | 2,27 | 0,150 | 0,582 | 0,919 | 0,423 | 1 |
| 2,61 | 0,145 | 0,860 | 0,630 | 0,454 | 2,27 | 0,140 | 0,609 | 0,757 | 0,492 | 2 |
| 2,19 | 0,140 | 1,180 | 0,690 | 0,445 | 2,33 | 0,146 | 0,666 | 0,962 | 0,444 | 3 |
| 2,50 | 0,160 | 0,863 | 0,798 | 0,459 | 2,52 | 0,162 | 0,784 | 0,856 | 0,448 | 4 |
| 2,80 | 0,158 | 0,806 | 0,753 | 0,532 | 2,48 | 0,149 | 0,604 | 0,856 | 0,597 | 5 |
| 2,65 | 0,148 | 0,675 | 0,663 | 0,439 | 2,93 | 0,186 | 0,651 | 0,805 | 0,465 | 6 |
| 2,40 | 0,162 | 0,829 | 0,670 | 0,374 | 2,49 | 0,151 | 0,698 | 0,776 | 0,417 | 7 |
| 2,28 | 0,138 | 0,520 | 0,826 | 0,405 | 2,86 | 0,184 | 0,565 | 0,857 | 0,388 | 8 |
| 2,34 | 0,151 | 0,812 | 0,873 | 0,369 | 2,18 | 0,141 | 0,575 | 1,190 | 0,352 | 9 |
| 3,01 | 0,184 | 0,580 | 0,860 | 0,410 | 2,46 | 0,183 | 0,542 | 0,930 | 0,379 | 10 |
| 2,52 | 0,155 | 0,794 | 0,752 | 0,435 | 2,48 | 0,159 | 0,628 | 0,891 | 0,440 | Moyenne |
| 2,54 | 0,156 | 1,140 | 0,568 | 0,394 | 2,46 | 0,140 | 0,820 | 0,745 | 0,385 | 11 |
| 2,73 | 0,152 | 1,610 | 0,550 | 0,385 | 2,78 | 0,148 | 0,945 | 0,686 | 0,385 | 12 |
| 2,53 | 0,157 | 0,889 | 0,740 | 0,534 | 2,43 | 0,149 | 0,902 | 0,685 | 0,430 | 13 |
| 2,42 | 0,150 | 1,080 | 0,589 | 0,458 | 2,10 | 0,126 | 0,695 | 0,695 | 0,401 | 14 |
| 2,32 | 0,127 | 1,220 | 0,559 | 0,323 | 2,17 | 0,119 | 0,775 | 0,857 | 0,345 | 15 |
| 2,45 | 0,155 | 0,719 | 0,628 | 0,483 | 2,44 | 0,153 | 0,613 | 0,809 | 0,490 | 16 |
| 2,61 | 0,163 | 1,100 | 0,557 | 0,399 | 2,50 | 0,156 | 0,881 | 0,641 | 0,392 | 17 |
| 2,40 | 0,163 | 1,020 | 0,855 | 0,443 | 2,21 | 0,138 | 0,687 | 0,970 | 0,383 | 18 |
| 3,06 | 0,183 | 1,170 | 0,690 | 0,383 | 2,84 | 0,175 | 1,070 | 0,875 | 0,333 | 19 |
| 2,74 | 0,162 | 1,270 | 0,561 | 0,362 | 2,74 | 0,163 | 0,909 | 0,751 | 0,378 | 20 |
| 2,58 | 0,157 | 1,122 | 0,630 | 0,416 | 2,47 | 0,147 | 0,830 | 0,771 | 0,393 | Moyenne |
| 2,69 | 0,155 | 0,845 | 0,677 | 0,337 | 2,25 | 0,134 | 0,657 | 0,821 | 0,263 | 21 |
| 2,56 | 0,154 | 1,120 | 0,571 | 0,298 | 2,41 | 0,138 | 0,940 | 0,644 | 0,242 | 22 |
| 2,55 | 0,149 | 1,150 | 0,771 | 0,259 | 2,28 | 0,147 | 0,812 | 1,030 | 0,272 | 23 |
| 2,56 | 0,157 | 0,940 | 0,692 | 0,288 | 2,37 | 0,139 | 0,903 | 0,706 | 0,209 | 24 |
| 2,70 | 0,163 | 0,889 | 0,690 | 0,305 | 2,37 | 0,149 | 0,759 | 0,855 | 0,259 | 25 |
| 2,76 | 0,164 | 0,933 | 0,589 | 0,280 | 2,47 | 0,152 | 0,767 | 0,696 | 0,226 | 26 |
| 2,66 | 0,166 | 1,070 | 0,679 | 0,304 | 2,32 | 0,140 | 0,976 | 0,764 | 0,270 | 27 |
| 2,61 | 0,165 | 0,888 | 0,738 | 0,337 | 2,48 | 0,151 | 0,965 | 0,753 | 0,269 | 28 |
| 2,94 | 0,173 | 0,840 | 0,480 | 0,308 | 2,62 | 0,154 | 0,609 | 0,612 | 0,274 | 29 |
| 2,58 | 0,150 | 0,818 | 0,840 | 0,283 | 2,34 | 0,138 | 0,649 | 0,980 | 0,265 | 30 |
| 2,66 | 0,1595 | 0,949 | 0,673 | 0,300 | 2,39 | 0,144 | 0,804 | 0,786 | 0,255 | Moyenne |

Tableau J₃

Etude comparative de la composition minérale de la pulpe
et de la foliole - Pourcentages des éléments K, Ca, Mg,
rapportés à la somme K+Ca+Mg.

| N°
arbi-
traire | Analyse de la pulpe
sèche déshuillée | | | Analyse des folioles | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|----------------------|------|------|----------------------|------|------|
| | | | | Feuille de rang N°9 | | | Feuille de rang N°17 | | |
| | % K | % Ca | % Mg | % K | % Ca | % Mg | % K | % Ca | % Mg |
| 1 | 61,8 | 21,4 | 16,8 | 40,1 | 37,3 | 22,7 | 30,2 | 47,8 | 22,0 |
| 2 | 45,9 | 28,0 | 26,1 | 44,2 | 32,4 | 23,4 | 32,8 | 40,7 | 26,5 |
| 3 | 49,3 | 19,3 | 31,4 | 51,0 | 29,8 | 19,2 | 32,1 | 46,4 | 21,4 |
| 4 | 49,7 | 30,7 | 19,6 | 40,7 | 37,6 | 21,7 | 37,5 | 41,0 | 21,5 |
| 5 | 52,4 | 21,0 | 26,6 | 38,5 | 36,0 | 25,5 | 29,4 | 41,6 | 29,0 |
| 6 | 58,5 | 23,1 | 18,5 | 38,0 | 37,3 | 24,7 | 33,9 | 41,9 | 24,2 |
| 7 | 62,6 | 17,1 | 20,3 | 44,3 | 35,8 | 20,0 | 36,9 | 41,0 | 22,1 |
| 8 | 54,5 | 24,8 | 20,7 | 29,7 | 47,2 | 23,1 | 31,2 | 47,3 | 21,4 |
| 9 | 54,6 | 22,2 | 23,2 | 39,5 | 42,5 | 18,0 | 27,2 | 56,2 | 16,6 |
| 10 | 54,5 | 21,0 | 24,6 | 31,4 | 46,5 | 22,1 | 29,3 | 50,2 | 20,5 |
| Moyenne | 54,4 | 22,9 | 22,8 | 39,7 | 38,2 | 22,0 | 32,0 | 45,4 | 22,5 |
| 11 | 46,2 | 28,7 | 25,2 | 54,2 | 27,0 | 18,7 | - | - | - |
| 12 | 54,0 | 22,3 | 23,7 | 63,3 | 21,6 | 15,1 | 46,9 | 34,0 | 19,1 |
| 13 | 36,8 | 26,6 | 36,6 | 41,1 | 34,2 | 24,7 | 44,7 | 34,0 | 21,3 |
| 14 | 48,9 | 20,0 | 31,1 | 50,8 | 27,7 | 21,5 | 38,8 | 38,8 | 22,4 |
| 15 | 50,4 | 24,5 | 25,0 | 58,0 | 26,6 | 15,4 | 39,2 | 43,4 | 17,5 |
| 16 | 44,1 | 20,6 | 35,3 | 39,0 | 34,3 | 26,4 | 32,1 | 42,4 | 25,6 |
| 17 | 43,3 | 24,3 | 32,4 | 53,5 | 27,1 | 19,4 | 46,0 | 33,4 | 20,5 |
| 18 | 44,0 | 33,5 | 22,5 | 44,0 | 36,9 | 19,1 | 33,7 | 47,5 | 18,8 |
| 19 | 36,0 | 27,5 | 36,1 | 52,2 | 30,8 | 17,1 | 47,0 | 38,4 | 14,6 |
| 20 | 42,8 | 29,0 | 28,2 | 57,9 | 25,6 | 16,5 | 44,6 | 36,8 | 18,5 |
| Moyenne | 44,7 | 25,7 | 29,6 | 51,4 | 29,2 | 19,4 | 41,4 | 38,7 | 19,8 |
| 21 | 58,3 | 23,2 | 18,4 | 45,5 | 36,4 | 18,1 | 37,7 | 47,2 | 15,1 |
| 22 | 55,4 | 28,0 | 16,6 | 56,3 | 28,7 | 15,0 | 51,5 | 35,3 | 13,3 |
| 23 | 61,0 | 20,6 | 18,3 | 52,8 | 35,4 | 11,9 | 38,4 | 48,7 | 12,9 |
| 24 | 57,8 | 26,3 | 15,9 | 49,0 | 36,0 | 15,0 | 49,7 | 38,8 | 11,5 |
| 25 | 60,0 | 22,7 | 17,4 | 47,2 | 36,6 | 16,2 | 40,5 | 45,6 | 13,9 |
| 26 | 64,7 | 19,4 | 15,9 | 51,8 | 32,7 | 15,5 | 45,4 | 41,2 | 13,4 |
| 27 | 61,9 | 18,8 | 19,2 | 52,1 | 33,1 | 14,8 | 48,6 | 38,0 | 13,4 |
| 28 | 67,3 | 16,2 | 16,8 | 45,2 | 37,6 | 17,2 | 48,6 | 37,9 | 13,5 |
| 29 | 66,5 | 16,9 | 16,6 | 51,6 | 29,5 | 18,9 | 40,7 | 40,9 | 18,3 |
| 30 | 61,0 | 20,9 | 18,0 | 42,1 | 43,3 | 14,6 | 34,3 | 51,7 | 14,0 |
| Moyenne | 61,4 | 21,3 | 17,3 | 49,4 | 34,9 | 15,7 | 43,5 | 42,5 | 13,9 |

Tableau J₄

Etude comparative de la composition minérale de la pulpe et de la foliole - Analyses de la pulpe rapportées aux poids frais et aux poids d'eau.

| N°
arbi-
raire | En grammes pour 1000 grammes
de pulpe fraîche | | | | | | En grammes pour 1000 grammes
d'eau | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|------|-------|-------|---------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| | Cendres | N | P | K | Ca | Mg | N | P | K | Ca | Mg |
| 1 | 6,2 | 2,36 | 0,202 | 1,11 | 0,385 | 0,297 | 8,85 | 0,75 | 4,15 | 1,45 | 1,10 |
| 2 | 12,4 | 2,33 | 0,268 | 1,35 | 0,825 | 0,765 | 5,12 | 0,58 | 2,98 | 1,80 | 1,70 |
| 3 | 8,6 | 2,06 | 0,205 | 1,09 | 0,430 | 0,700 | 6,42 | 0,63 | 3,40 | 1,30 | 2,15 |
| 4 | 8,2 | 2,75 | 0,244 | 1,11 | 0,685 | 0,440 | 10,30 | 0,91 | 4,15 | 2,55 | 1,65 |
| 5 | 9,8 | 2,53 | 0,198 | 1,03 | 0,415 | 0,523 | 7,48 | 0,59 | 3,05 | 1,20 | 1,55 |
| 6 | 10,4 | 2,32 | 0,229 | 1,77 | 0,700 | 0,560 | 6,43 | 0,63 | 4,90 | 1,90 | 1,55 |
| 7 | 8,9 | 2,56 | 0,291 | 1,66 | 0,440 | 0,541 | 7,70 | 0,85 | 4,91 | 1,20 | 1,60 |
| 8 | 9,0 | 2,54 | 0,252 | 1,52 | 0,690 | 0,577 | 7,31 | 0,72 | 4,37 | 1,95 | 1,65 |
| 9 | 12,3 | 2,51 | 0,246 | 1,39 | 0,565 | 0,592 | 6,29 | 0,62 | 3,48 | 1,40 | 1,48 |
| 10 | 8,5 | 2,34 | 0,202 | 1,31 | 0,500 | 0,591 | 5,70 | 0,49 | 3,18 | 1,20 | 1,44 |
| enne | 9,43 | 2,43 | 0,234 | 1,33 | 0,563 | 0,559 | 7,16 | 0,677 | 3,86 | 1,595 | 1,585 |
| 11 | 14,8 | 2,26 | 0,288 | 1,19 | 0,730 | 0,650 | 5,50 | 0,70 | 2,85 | 1,80 | 1,60 |
| 12 | 11,6 | 2,06 | 0,269 | 1,22 | 0,500 | 0,540 | 6,47 | 0,825 | 3,90 | 1,60 | 1,70 |
| 13 | 12,3 | 2,38 | 0,286 | 1,10 | 0,815 | 1,130 | 5,03 | 0,60 | 2,40 | 1,70 | 2,40 |
| 14 | 11,2 | 2,31 | 0,220 | 1,21 | 0,495 | 0,772 | 6,67 | 0,63 | 3,50 | 1,40 | 2,20 |
| 15 | 11,0 | 2,79 | 0,248 | 1,33 | 0,645 | 0,666 | 7,03 | 0,70 | 3,80 | 1,80 | 1,90 |
| 16 | 13,3 | 2,21 | 0,242 | 0,98 | 0,455 | 0,790 | 6,27 | 0,68 | 2,80 | 1,30 | 2,20 |
| 17 | 15,4 | 2,33 | 0,301 | 1,07 | 0,605 | 0,800 | 6,85 | 0,88 | 3,10 | 1,80 | 2,30 |
| 18 | 16,0 | 2,08 | 0,242 | 1,26 | 0,960 | 0,644 | 5,45 | 0,63 | 3,30 | 2,50 | 1,70 |
| 19 | 19,7 | 2,98 | 0,360 | 1,31 | 0,980 | 1,290 | 7,22 | 0,85 | 3,20 | 2,40 | 3,10 |
| 20 | 14,8 | 2,22 | 0,315 | 1,32 | 0,880 | 0,865 | 5,03 | 0,71 | 3,00 | 2,00 | 1,95 |
| enne | 14,0 | 2,36 | 0,277 | 1,20 | 0,706 | 0,815 | 6,15 | 0,720 | 3,08 | 1,830 | 2,10 |
| 21 | 11,7 | 2,00 | 0,192 | 2,20 | 0,875 | 0,695 | 3,78 | 0,36 | 4,15 | 1,30 | 1,31 |
| 22 | 10,7 | 2,20 | 0,217 | 1,92 | 0,960 | 0,570 | 5,75 | 0,57 | 5,00 | 1,50 | 1,49 |
| 23 | 10,8 | 2,31 | 0,196 | 1,83 | 0,615 | 0,550 | 6,16 | 0,52 | 4,90 | 1,45 | 1,46 |
| 24 | 8,9 | 2,23 | 0,203 | 1,57 | 0,720 | 0,430 | 7,15 | 0,65 | 5,00 | 1,40 | 1,38 |
| 25 | 8,6 | 2,22 | 0,205 | 1,75 | 0,650 | 0,507 | 6,30 | 0,58 | 5,00 | 1,45 | 1,44 |
| 26 | 10,5 | 2,52 | 0,225 | 2,29 | 0,685 | 0,562 | 6,97 | 0,62 | 6,35 | 1,55 | 1,55 |
| 27 | 11,1 | 1,99 | 0,196 | 2,27 | 0,685 | 0,704 | 3,86 | 0,39 | 4,50 | 1,40 | 1,41 |
| 28 | 8,8 | 2,32 | 0,162 | 2,36 | 0,485 | 0,494 | 6,80 | 0,47 | 6,90 | 1,45 | 1,45 |
| 29 | 10,2 | 2,26 | 0,213 | 2,22 | 0,565 | 0,554 | 5,30 | 0,50 | 5,20 | 1,30 | 1,30 |
| 30 | 12,1 | 2,50 | 0,219 | 2,29 | 0,730 | 0,675 | 6,04 | 0,53 | 5,50 | 1,65 | 1,65 |
| enne | 10,3 | 2,255 | 0,203 | 2,05 | 0,697 | 0,574 | 5,81 | 0,511 | 5,25 | 1,445 | 1,444 |

Etude comparative de la composition minérale de la pulpe
et de la foliole
Autres caractéristiques des arbres
étudiés.

| N°
arbi-
traire | Production | | % Eau
pulpe fraîche mesuré | | % M.G.
pulpe fraîche | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| | estimée
sur
10 mois
en kg. | mesurée
pendant
les
analyses
kg. | des
échantillons
analysés | moyenne
des fruits
de l'arbre | mesuré
par extraction
au Soxhlet
sur les
échantillons | estimé
moyenne
d'après
les %
d'eau. |
| 1 | 76 | 62 | 26,7 | 28,7 | 57,0 | 54,45 |
| 2 | 90 | 50 | 45,4 | 38,0 | 38,2 | 46,05 |
| 3 | 165 | 113 | 32,1 | 32,7 | 52,8 | 50,45 |
| 4 | 101 | 68 | 26,7 | 29,2 | 57,8 | 53,95 |
| 5 | 122 | 72 | 33,8 | 34,0 | 50,0 | 50,05 |
| 6 | 80 | 44 | 36,1 | 36,6 | 45,4 | 44,85 |
| 7 | 63 | 48 | 33,2 | 34,0 | 47,1 | 47,45 |
| 8 | 133 | 97 | 34,8 | 36,8 | 49,8 | 47,70 |
| 9 | 75 | 51 | 39,9 | 37,3 | 43,8 | 46,75 |
| 10 | 151 | 139 | 41,1 | 43,4 | 42,7 | 41,10 |
| Moyenne | 105,6 | 74,5 | 35,00 | 35,00 | 48,55 | 48,30 |
| 11 | 102 | 53 | 41,1 | 40,6 | 37,8 | 39,50 |
| 12 | 71 | 29 | 31,8 | 32,3 | 52,3 | 49,05 |
| 13 | 76 | 41 | 47,4 | 39,5 | 37,9 | 40,60 |
| 14 | 131 | 78 | 34,6 | 35,7 | 45,7 | 44,40 |
| 15 | 78 | 64 | 35,3 | 36,9 | 46,9 | 43,20 |
| 16 | 102 | 56 | 35,3 | 34,9 | 45,4 | 45,20 |
| 17 | 134 | 61 | 34,0 | 31,3 | 44,6 | 49,70 |
| 18 | 89 | 54 | 38,2 | 41,4 | 41,5 | 38,70 |
| 19 | 100 | 45 | 41,3 | 38,2 | 35,3 | 40,90 |
| 20 | 137 | 19 | 44,1 | 36,4 | 34,8 | 44,95 |
| Moyenne | 98,7 | 50,0 | 38,30 | 36,70 | 41,80 | 43,60 |
| 21 | 111 | 91 | 53,0 | 44,6 | 31,8 | 39,40 |
| 22 | 217 | 178 | 38,0 | 40,1 | 43,9 | 42,90 |
| 23 | 222 | 114 | 37,5 | 36,3 | 43,7 | 45,70 |
| 24 | 148 | 74 | 31,2 | 31,4 | 50,9 | 50,60 |
| 25 | 140 | 112 | 35,2 | 36,0 | 49,2 | 46,00 |
| 26 | 76 | 76 | 35,1 | 40,0 | 45,4 | 42,00 |
| 27 | 164 | 98 | 50,2 | 48,5 | 35,3 | 35,50 |
| 28 | 55 | 47 | 34,1 | 32,1 | 48,3 | 49,90 |
| 29 | 144 | 103 | 42,6 | 42,1 | 42,0 | 41,00 |
| 30 | 144 | 36 | 41,3 | 42,1 | 38,7 | 39,90 |
| Moyenne | 142,0 | 77,0 | 39,95 | 39,30 | 43,95 | 43,30 |

